

くん煙剤等の使用方法

凡例：収穫前日数／使用可能回数 *a：開花直前～幼果期 *b：発生初期

2. 自然式くん煙剤の種類と主な適用作物および病害虫

薬剤名	作用機分類コード	使用量	病害虫名	使用										準																				
				野	菜	果樹	花き類・観葉植物	野菜	果樹	花き類・観葉植物	野菜	果樹	花き類・観葉植物	野菜	果樹	花き類・観葉植物																		
フルピカくん煙剤	9	50g(1錠)/500m ³	うどんこ病 灰色かび病	キス	メ	ト	ト	ミ	ナ	ト	ウ	シ	シ	イ	サ	ア	カ	ミ	ブ	マ	カ	ネ	シ	ヨ	ン	ク	ウ	ラ						
スミレックスくん煙顆粒	2	6g/100m ³	灰色かび病 菌核病	ユ	ウ	リ	カ	ニ	ス	ツ	キ	イ	チ	ゴ	ウ	ラ	ガ	ス	ン	カ	シ	キ	ツ	ウ	シ	ゴ	ド	ウ	シ	ヨ	ン	ク	ウ	ラ
ロブラールくん煙剤	2	100g(50g2個)/300～400m ³	灰色かび病 菌核病 つる枯病	ス	ツ	キ	イ	ニ	ス	ツ	キ	イ	チ	ゴ	ウ	ラ	ガ	ス	ン	カ	シ	キ	ツ	ウ	シ	ゴ	ド	ウ	シ	ヨ	ン	ク	ウ	ラ
トリフミンジェット	3	50g/400m ³ 100g/400m ³	うどんこ病 葉かび病 オオかび病 白さび病	ス	ツ	キ	イ	ニ	ス	ツ	キ	イ	チ	ゴ	ウ	ラ	ガ	ス	ン	カ	シ	キ	ツ	ウ	シ	ゴ	ド	ウ	シ	ヨ	ン	ク	ウ	ラ
ダニコールジェット	M5	20g/100m ³	うどんこ病 葉かび病 菌核病 黒枯病	ス	ツ	キ	イ	ニ	ス	ツ	キ	イ	チ	ゴ	ウ	ラ	ガ	ス	ン	カ	シ	キ	ツ	ウ	シ	ゴ	ド	ウ	シ	ヨ	ン	ク	ウ	ラ
モレスタン水	UN・M10	20g/100m ³	うどんこ病	ス	ツ	キ	イ	ニ	ス	ツ	キ	イ	チ	ゴ	ウ	ラ	ガ	ス	ン	カ	シ	キ	ツ	ウ	シ	ゴ	ド	ウ	シ	ヨ	ン	ク	ウ	ラ
ハンチョTFジェット	U6・3	50g/400m ³	うどんこ病	ス	ツ	キ	イ	ニ	ス	ツ	キ	イ	チ	ゴ	ウ	ラ	ガ	ス	ン	カ	シ	キ	ツ	ウ	シ	ゴ	ド	ウ	シ	ヨ	ン	ク	ウ	ラ
シーマージェット	21A・1A	75g/400m ³	うどんこ病 アブラムシ類 ハダニ類	ス	ツ	キ	イ	ニ	ス	ツ	キ	イ	チ	ゴ	ウ	ラ	ガ	ス	ン	カ	シ	キ	ツ	ウ	シ	ゴ	ド	ウ	シ	ヨ	ン	ク	ウ	ラ

