

3. 常温煙霧に使用できる薬剤の種類と主な適用作物および病害虫

薬剤名	希釈倍数 ・使用量	使 用 基 準								対象 病害虫名		
		野 菜 類	キュ ウ リ	メ ロ ン	ト マ ト	ミニ ト マト	ナ ス	ピー マ ン	イ チ ゴ		ブ ドウ	
Zボルドー	588g/10a		-/-					-/-			べと病 すすかび病	
アグロケア水	1000倍	1/-									灰色かび病	
アフエットFL	150g/10a		1/3								うどんこ病	
スミレックス水	200g/10a		1/2								すすかび病	
	250g/10a						1/6				灰色かび病	
ダコニール 1000FL	33倍		1/12								べと病	
							1/4				うどんこ病	
					1/4							すすかび病
					1/4							葉かび病
フルピカFL	50倍								1/3		うどんこ病	
	イチゴ 50倍 キュウリ 67倍 ナス 67倍	1/4					1/4		1/3		うどんこ病	
ベルコートFL	150ml/10a		1/7								うどんこ病、褐斑病、 菌核病、黒星病、炭疽 病、灰色かび病	
ベンレート水	150g/10a		1/3		1/5						うどんこ病、褐紋病、 黒枯病、すすかび病、 灰色かび病	
ボトキラー水	300g/10a	*b/-									灰色かび病	
モレスタン水	50～100g/10a		1/3								うどんこ病	
	100g/10a			3/10								
ロブラール水	200g/10a		1/4		1/3	1/3				*a/3	灰色かび病	
アドマイヤー水	100g/10a		1/3				1/2				アブラムシ類	
	200g/10a									21/2	アザミヤ類	
コテツFL	150ml/10a									14/2	チャノイロアザミヤ	
コロマイト水*1	150g/10a									7/2	ハダニ類	

凡例…収穫前日数 / 使用可能回数 *1:大粒種ブドウのみ適用

*a:開花期～幼果期、但し、収穫60日前まで *b:発病前～発病初期

4. 専用電気加熱式くん煙器使用による薬剤と主な適用作物および病害虫

薬剤名	使用量	対象作物	対象病害虫名
硫黄粒剤*	6～16g/2000㎡ (高さ2m、床面積1000㎡)	トウガラシ類、カボチャ、キュウリ、スイカ、メロン、トマト、ミニトマト、ナス、ピーマン、イチゴ、バラ	うどんこ病
	10～16g/2000㎡ (高さ2m、床面積1000㎡)	キク	白さび病

*:商品によって作目の登録が異なる場合があるので必ず商品のラベル等を確認してから使用する。