

ムギ類^{*1} (作物群登録)

薬剤名	作用 機構 分類 コード	人 畜 毒 性	使 用 時 期 (日 数)	赤 い さ ど ろ び こ	赤 い さ ど ろ び こ	う さ ど ろ び こ	斑 点 病	裸 黒 穂 病	条 点 病	黒 い ま ぐ さ 黒 穂 病	眼 ま ぐ さ 黒 穂 病	雲 形 斑 病	黄 斑 病	網 斑 病	ア ブ ラ ム シ 類	ヒ メ ト ビ ウ シ カ エ	ム ギ ア カ タ マ バ エ	ム ギ キ モ グ リ バ エ	ア ワ ヨ ト ウ
カリグリーン溶	NC		1	-		◎													
撒粉ボルドー粉DL	M1		-	-	◎														
イオウFL	M2		*c	-	◎	◎	◎												
クムラス顆水	M2		-	-	◎	◎	◎												
コロナFL	M2		-	-	◎	◎	◎												
サルファーゾル	M2		*c	-	◎	◎	◎												
石灰硫黄合剤	M2		-	-	◎	◎	◎												
トップジンM水㊦	1		30	*b	ム	ム					ム								
トップジンM粉DL㊦	1		14	*b	ム														
カナメFL	7	劇	7	2		◎	◎												
バシタック水75	7		30	2			◎												
バシタック粉	7		30	2			◎												
ストロビーFL	11		14	3	ム	ム	ム												
トリフミン水	3		14	3	◎	◎													
			*a	1				◎	◎		◎			◎					
ワークアップFL	3		7	3	◎	◎	◎			◎			◎	◎					
ワークアップ粉DL	3		7	3	◎	◎	◎						◎						
コナケシ顆水	U6		7	2		◎													
ベフラン液25	M7	劇	*a	1				ム	ム	ム				ム					
ベンレートT水20㊦	1・M3		*a	1				◎	◎	◎		◎							
ホーマイ水	1・M3		*a	1				ム		ム									
スミトップM粉㊦	1・1B		14	1	ム	ム									ム	ム	ム		
スミチオン乳	1B		14	1											オ			オ	オ
アグロスリン乳	3A	劇	21	3											◎				
トレボン乳	3A		14	2											◎	◎			
モスピラン顆溶	4A	劇	7	2											◎				

㊦：チオファネートメチル含有剤 ㊧：ペノミル含有剤 ㊨：使用した場合には同じ作での
 ◎は使用しないこと。その逆も同様（種子への処理および塗布処理を除く、詳細はP. 857
 参照）。
^{*1}：ムギ類…「農薬登録における適用作物名について」

(P. 58) を参照のこと。

*a: 播種前

*b: 3回以内(出穂期以降は1回以内)

*c: 発病前～発病初期

オ: 大麦、小麦を除く

ム: 小麦を除く