

ムギ類*1 (作物群登録)

薬剤名	作用機 構分類 コード	人 畜 毒 性	使用 時期 (日 数)	使 用 回 数	赤 か び 病	赤 さ び 病	う ど ん び こ 病	さ び 病	斑 葉 病	裸 黒 穂 病	条 斑 病	黒 点 病	な ま ぐ さ 黒 穂 病	眼 紋 病	雲 形 病	黄 斑 病	網 斑 病	ア ブ ラ ム シ 類	ヒ メ ト ビ ウ ン カ	ム ギ ア カ タ マ バ エ	ム ギ モ グ リ バ エ	ア ワ ヨ ト ウ	
																							1
カリグリーン溶	NC		1	-			◎																
撒粉ボルドー粉DL	M1		-	-	◎																		
イオウFL	M2		*c	-	◎	◎	◎																
クムラス顆水	M2		-	-	◎	◎	◎																
コロナFL	M2		-	-	◎	◎	◎																
サルファーゾル	M2		*c	-	◎	◎	◎																
石灰硫黄合剤	M2		-	-	◎	◎	◎																
トップジンM水㊟	1		30	*b	ム	ム									ム								
トップジンM粉DL㊟	1		14	*b	ム																		
カナメFL	7		劇	7	2		◎	◎															
バシタック水75	7		30	2				◎															
バシタック粉	7		30	2				◎															
ストロビーFL	11		14	3	ム	ム	ム																
トリフミン水	3		14	3	◎	◎	◎																
ワークアップFL	3		7	3	◎	◎	◎					◎				◎	◎						
ワークアップ粉DL	3		7	3	◎	◎	◎										◎						
コナケシ顆水	U6		7	2			◎																
ベフラン液25	M7		劇	*a	1					ム	ム	ム					ム						
ベンレートT水20㊟	1・M3		*a	1					◎	◎	◎	◎		◎									
ホーマイ水	1・M3		*a	1						ム			ム										
スミチオン乳	1B		14	1																オ		オ	オ
アグロスリン乳	3A		劇	21	3															◎			
トレボン乳	3A		14	2																◎	◎		
モスピラン顆溶	4A		劇	7	2															◎			
スミトップM粉㊟	1・1B		14	1	ム	ム														ム	ム	ム	

㊟：チオファネートメチル含有剤 ◎：ベノミル含有剤 ㊟を使用した場合には同じ作での
 ◎は使用しないこと。その逆も同様（種子への処理および塗布処理を除く）。

*1:ムギ類…「農薬登録における適用作物名について」（P.58）を参照のこと。

*a:播種前

*b:3回以内(出穂期以降は1回以内)

*c:発病前～発病初期

オ:大麦、小麦を除く

ム:小麦を除く

ム
ギ
類