

豆類（未成熟）*¹（作物群登録）

（野菜類の登録農薬も使用できる。豆類（種実）の登録農薬は使用不可）

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期（日数）	使用回数	灰色かび病	菌核病	炭疽病	さび病	苗立枯病	立枯病
ベンレート水㊟	1		30	3		ヤ				
			*b	2						ヤ
アフエットFL	7		1	3	ダ	ダ		ダ		
カナメFL	7	劇	1	4	ミ	ミ				
パレード20FL	7		1	3	エ	エ				
スクレアFL	11		1	3	エ	エ	エ			
ファンタジスタ顆水	11		1	3	マ	マ				
セイビアーFL20	12		1	3	ヤ					
リゾレックス水	14		*c	1					㊟サ	
ビクシオDF	17		1	4		㊟				
ニマイパー水	1・10		30	3	ヤ	ヤ	ヤ			

㊟：チオファネートメチル含有剤 ㊟：ベノミル含有剤 ㊟を使用した場合には同じ作での㊟は使用しないこと。その逆も同様（種子への処理および塗布処理を除く、詳細はP. 856参照）。

*1：豆類（未成熟）…「農薬登録における適用作物名について」（P. 58）を参照のこと。

*a：播種前 *b：発芽14日後まで *c：播種時

㊟：リゾクトニア菌による病害

エ：さやえんどうを除く

サ：さやえんどう、実えんどう、未成熟そらまめを除く

ダ：えだまめを除く

マ：えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く

ミ：さやえんどう、未成熟そらまめを除く

ヤ：えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く

豆類(未成熟)*1 (作物群登録)

(野菜類の登録農薬も使用できる。豆類(種実)の登録農薬は使用不可)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(回数)	使用回数	アブラムシ	コナジラミ	カメムシ	アザミウマ	ハモグリバエ	ダイズサバ	タバコバ	オオタバコ	ヨロイチョモ	シロイチョモ	ハスモンクイ	マメヒメサヤ	シロイチョモ	ウズキ	ネギ	インゲン	コガネ	チャノホ	ハダニ
コロマイト乳	6		1	2																			◎
エコマスターＢＴ	11A	*d	-	-									◎	◎									
フローバックＤＴ	11A	*d	-	-									◎	◎									
スミチオン乳	1B		21	4	エ	◎	◎		◎						◎	◎	◎						
マラソン乳	1B		7	3		◎	◎	◎	◎											◎	◎		◎
アディオン乳	3A		14	3	ソ	◎		◎	◎				◎	◎	◎				◎	◎			
ガードベイトＡ粒	3A	*c	3	3															◎				
アドマイヤー顆水	4A	劇	*e	2	ミ	◎																	
アドマイヤー１粒	4A		*b	1	エ	◎																	
スタークル顆溶	4A		7	2	ア	◎			◎														
ダントツ溶	4A		3	3	ダ	◎																	
モスピラン顆溶	4A	劇	7	3	ヤ	◎	◎		◎														
ディアナＳＣ	5		1	2	イ			◎	◎						◎								
アニキ乳	6		1	3	え										◎								
アフーム乳	6		3	2	イ				◎														
コルト顆水	9B		1	3	イ	◎																	
コテツFL	13	劇	1	2	み																		◎
ダニトロンFL	21A		7	1	イ																		◎◎
フェニックス顆水	28		1	2	ヤ										◎								
グレーシア乳	30		1	2	ダ			◎	◎						◎								
ブレオFL	UN		1	2	イ				◎			◎		◎	◎								

*1:豆類(未成熟)・・・「農薬登録における適用作物名について」(P.58)を参照のこと。

*a:播種前 *b:播種時又は定植時 *c:生育初期 *d:発生初期(但し収穫前日まで)

*e:収穫前日まで(但し露地栽培については開花期終了後から使用)

ア:エダマメ、サヤインゲン、サヤエンドウ、実エンドウ、未成熟ササゲ、未成熟ソラマメを除く

イ:サヤインゲンを除く

エ:エダマメ、サヤインゲン、未成熟ソラマメを除く

ソ:エダマメ、サヤインゲン、サヤエンドウ、未成熟ソラマメを除く

ダ:エダマメを除く

ミ:未成熟ソラマメを除く

ヤ:エダマメ、サヤインゲン、サヤエンドウを除く

え:エダマメ、サヤエンドウを除く

み:サヤインゲン、サヤエンドウ、実エンドウを除く

豆類
(未成熟)