

セリ科葉菜類*1 (作物群登録)(野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	苗木立枯病	アブラムシ類	コナジラミ類	ハモグリバエ類	マメハモグリバエ	ヨトウムシ	ハスモンヨトウ	キアゲハ	ハダニ類	
オーソサイド水80	M4		*a	2	リ									
コロマイト乳	6		3	1									セ	
			1	1									あ	
			1	1										こ
			1	2										せ
			3	2										る
	収	2											み	
アドマイヤーFL	4A	劇	14	1		コ								
			3	2		こ								
			7	3		せ								
			14	1		ば								
カスケード乳	15		7	2							ミ			
			14	3			せ		せ					
			14	3							せ			
			7	1							ば			
	収	2								み	み	み		
ブレバゾンFL 5	28		7	1						パ				
			7	1							ば			
ブレオFL	UN		3* ^b	2								ル		
			1	2					せ	せ		せ		

*1:セリ科葉菜類…「農薬登録における適用作物名について」(P. 58)を参照のこと。

*a:は種後から2~3葉期まで

*b:みつばの伏せ込み栽培は伏せ込み前まで

コ:コリアンダー(葉)、セルリー、パセリ、ミツバ及びセリを除く

セ:みつば、コリアンダー(葉)、セルリー、セリ(水耕栽培)、あしたばを除く

パ:パセリを除く ミ:ミツバ、パセリ及びセルリーを除く

リ:セリを除く ル:セルリーを除く あ:あしたば こ:コリアンダー(葉) せ:セリ(水耕)

み:みつば る:セルリー 収:収穫3日前まで(但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで) ば:パセリ