<u>トワカラシ類</u>													
	作	人	使	使	疫	う	斑	灰	黒	炭	菌	苗	斑
	用機構分類	畜	用時期	用		ど		色				立	点
薬剤名	分		793			ん	点	カュ	枯	疽	核		細
	ت ا	毒	日数	旦		۲		び				枯	菌
	ド	性	$\overline{}$	数	病	病	病	病	病	病	病	病	病
トリフミン水	3		1	5		0							
ラリー水	3		1	4		0	0						
カンタスDF	7		1	2				0	0				
スクレアFL	11		1	3						0	0		
ストロビーFL	11		1	2		シ							
			1	2		し			し				
ライメイFL	21		1	3	0								
ランマンFL	21		1	4	0								
	2		3	2				シ					
ロブラール水			1	2				し					
オリゼメート粒	P2		*a	1		0	0						
サンヨール乳	M1		1	4		甘							
オーソサイド水80	M4		*b	2								0	
ユニフォーム粒	4 · 11		1	1	シ								
			1	3	し								
シグナムWDG	7 · 11		1	2		0		0	0	0			
カスミンボルドー水	24 • M1		1	5		0	0						0

\*1:トウガラシ類…「農薬使用に関するよくあるお問い合わせ」(P.87)を参照のこと。

\*a:定植時 \*b:は種後から2~3葉期まで

シ:シシトウを除く 甘:甘長トウガラシ し:ししとう

ト**ウガラシ類\***<sup>1</sup> (作物群登録) (野菜類の登録農薬も使用できる)

<u>トウガラシ類゙゚</u>	(作物群	登	禄)	(野	菜类	質の	)登	録月	農薬	₹\$.	使月	月で	き	る)							
		人	使	使	ア	コ	ア	Ł	111	111	マ	ナ	タ	オ	ハ	ネ	コ	ケ	コ	チ	ハ
			ш					ラ	ナ	力	,						12		ナ	+	
	作		用		ブ	ナ	ザ	ズ	3	レン	メ			オ	ス	+	ガ			1	
	用		時		_	ľ	ĺ		+	+	ハ	ス	バ			ļ `	ネ		力	1	
	機	畜		用	ラ	ジ	31	ハ	イ					タ	モ	ij			1		ダ
## → 1 /z	構		期		/	~	`	ナ	l	1	モ	_		7		٧	ム			ホ	
薬剤名	分類					l	١.	ア	П	口	グ	3	コ		ン		シ		ガ	コ	
	カコ	盡		回	ム	ラ	ウ	ザ	ア	ア				バ	3	ム	ľ		ラ		11
	ī	112	日	Ш					ザ	ザ	IJ	バ	Ħ				類		ム	IJ	_
	ド		数		シ	3	マ	11	3	3	バ			コ	1	シ	幼			ダ	
			奴					ウ	ウ	ウ	, ,				·		29/3		シ		
		性	)	数	類	類	類	マ	マ	マ	エ	エ	類	ガ	ウ	類	虫	ラ	類	=	類
スピノエース顆水	5		1	2			甘		苴	苴											
ダブルシューターSE	- • 5		1	2		ピ	ピ							Ĵ							Ę
コロマイト乳	6		1	1		甘															
オンコル粒 5	1A		*d	1					0												
ダイアジノン粒5	1B		*f	3													0				
-			*b	2												0		0	L	Ш	
アディオン乳	3A		7	2	0								タ						L		
アーデント水	3A		1	2	0					0									L	Ш	0
アクタラ顆溶	4A		1	3	シ														L	Ш	
			1	3	l						し								し		
アクタラ粒5	4A		*a	1	0																
アドマイヤー顆水	4A	劇	*j	2	0		0		0	0											
アドマイヤー1粒	4A		*a	1	0		0		0	0											
アルバリン顆溶 スタークル顆溶	4A		1	2	0	0	0		0	0		0									
			*e		0	0															
アルバリン粒	4.4		*a	,	0		0		0	0											
スタークル粒	4A		*g	1	葉		葉		葉	葉											
			*h		0																
ダントツ溶	4A		1	3	0	0			0												
バリアード顆水	4A	劇	1	3	0																
ベストガード溶	4A		1	3		0															
			*a	1	シ				シ												
ベストガード粒	4A		*a	1	し				し												
			*e	1	し	じ															
モスピラン顆溶	4A	劇	1	2	シ														<u> </u>	Ш	
		1957	1	2	し														L		
ディアナSC	5		1	2			0												L		
アニキ乳	6		1	3		0								0	0				_	0	
アファーム乳	6		7	2										0					<u> </u>	Ш	
コルト顆水	9B		1	2	ア	ア										_			<u> </u>	Ш	
			1	3	廿	甘													<u> </u>	Ш	
チェス顆水	9B	_	1	3	0	<u> </u>	_	<u> </u>		_		_	_		_	_	_		<u> — </u>	Н	-
コテツFL	13	劇	1	2				,	シ	シ				シ					<u> </u>		シ
			1	2				し	し	し				l					$\vdash$	Н	し
カスケード乳	15		1	3		_	_		甘	_				,			_		$\vdash$	Н	
· ·			1	3										し						$\vdash$	
マッチ乳	15		1	4										0						H	6
ダニトロンFL	21A		1	1						<u> </u>							<u> </u>	<u> </u>		ш	0

トソルフン類	(作物群	显	欧八	(對	**	貝り	/显	亚水后	マ米	; D	文 /	11 (	Ç,	つり							
		人	使	使	ア	コ	ア	Ł	111	111	マ	ナ	タ	オ	ハ	ネ	コ	ケ	コ	チ	ハ
	作		用		ブ	ナ	ザ	ラズ	ナミ	カン	メ			オ	ス	丰	ガ		ナ	ヤ	
	機	畜	時	用	ラ	ジ	. "	ハハ	キィ		ハ	ス	バ	タ	モ	IJ	ネ		カイ	1	ダ
薬剤名	構分		期				'	ナア	一口	イロ	モ	131	コ	7	ン	י	ム		ガ	ホ	
	類コード	毒		□	ム	ラ	ウ	ナザ	アザ	アザ	グリ			バ	3	ム	シ *=		ラ	コリ	11
			数数		シ	111	マ	111 -	. 111	131	ッバ	バ	ガ	コ	ト	シ	類幼		4	ソ ダ	
		性		数	類	類	類	ウマ	ウマ	ウマ	工	工	類	ガ	ウ	類	虫	ラ	シ類	11	類
モベントFL	23		*i	1	灌	灌	灌		灌	灌										灌	灌
LAVA LLL	43		1	3	0	0	0		0	0										0	0
フェニックス顆水	28		1	2										0							
プレバソンFL 5	28		1	3										0	0						
) V/// VILO	20		*i	1		灌									灌						
グレーシア乳	30		1	2		ピ	ピ	上。	上。	飞				ピ						F°	ピ
プレオFL	UN		1	2			0	0	0	0			0	0							
サンヨール乳	-		1	4	甘																
アプロードエースFL	16 · 21A		1	2		0															

- \*1:トウガラシ類…「農薬使用に関するよくあるお問い合わせ」(P.87)を参照のこと。
- \*a:定植時
- \*b は種時又は定植時
- \*c:育苗期後半
- \*d: 育苗期後半または定植時
- \*e:育苗期
- \*f:収穫開始14日前まで
- \*g:定植時(但し、収穫30日前まで)
- \*h:生育期(但し、収穫開始14日前まで)
- \*i:育苗期後半~定植当日
- \*j:収穫前目まで(但し、露地栽培については開花期終了後)
- ア:甘長トウガラシを除く
- ン:シシトウを除く ピ:ピーマン及びとうがらし類(「農薬登録における適用作物名について」(P.58)を参照のこと。)
- 甘:甘長トウガラシ
- 葉:とうがらし (葉)
- タ:タバコガ
- 灌:灌注処理での登録

※トウガラシ(葉)は農薬取締法上は野菜類に分類される。葉を食用として収穫する場合、野菜類ま たはトウガラシ (葉) に登録がある農薬しか使用できない。

トウガラシ (葉) の登録における「使用時期(日数)」は、葉を収穫する前までの日数なので注意す る。