

トウガラシ類\*<sup>1</sup> (作物群登録)(野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	疫病	うどんこ病	斑点病	灰色かび病	黒枯病	炭疽病	菌核病	苗木立枯病	斑点細菌病
トリフミン水	3		1	5		◎							
ラリー水	3		1	4		◎	◎						
カンタスDF	7		1	2				◎	◎				
スクレアFL	11		1	3						◎	◎		
ストロビーFL	11		1	2			シ						
			1	2			し						
ライメイFL	21		1	3	◎					し			
ランマンFL	21		1	4	◎								
ロブラール水	2		3	2				シ					
			1	2				し					
オリゼメート粒	P2		*a	1		◎	◎						
サンヨール乳	M1		1	4			甘						
オーソサイド水80	M4		*b	2								◎	
ユニフォーム粒	4・11		1	1	シ								
			1	3	し								
シグナムWDG	7・11		1	2		◎		◎	◎	◎			
カスミンボルドー水	24・M1		1	5		◎	◎						◎

\*1: トウガラシ類…「農薬使用に関するよくあるお問い合わせ」(P.87)を参照のこと。

\*a: 定植時 \*b: は種後から2～3葉期まで

シ: シントウを除く

甘: 甘長トウガラシ し: ししとう



トウガラシ類\*1 (作物群登録)(野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(回数)	使用回数	ア	コ	ア	ヒ	ミ	ミ	マ	ナ	タ	オ	ハ	ネ	コ	ケ	チ	ハ	
					ブ	ナ	ザ	ラ	ミ	ナ	メ	ス	オ	ス	キ	ネ	カ	ノ	ダ	ニ	ニ
モベントFL	23		*i 1 1 3	1 3	灌◎	灌◎	灌◎	灌○	灌○											灌◎	灌◎
フェニックス顆水	28		1 2	1 3										◎							
ブレバゾンFL5	28		1 3 *i 1	1 3		灌								◎	◎	灌					
グレーシア乳	30		1 2	1 2		ピ	ピ	ピ	ピ	ピ				ピ							ピ
ブレオFL	UN		1 2	1 2			◎	○	○	○			◎	○							
サンヨール乳	-		1 4	1 4	甘																
アブロードエースFL	16・21A		1 2	1 2	◎																

\*1:トウガラシ類…「農薬使用に関するよくあるお問い合わせ」(P.87)を参照のこと。

\*a:定植時

\*b:は種時又は定植時

\*c:育苗期後半

\*d:育苗期後半または定植時

\*e:育苗期

\*f:収穫開始14日前まで

\*g:定植時(但し、収穫30日前まで)

\*h:生育期(但し、収穫開始14日前まで)

\*i:育苗期後半～定植当日

\*j:収穫前日まで(但し、露地栽培については開花期終了後)

ア:甘長トウガラシを除く

シ:シシトウを除く

ピ:ピーマン及びとうがらし類(「農薬登録における適用作物名について」(P.58)を参照のこと。)

甘:甘長トウガラシ

葉:とうがらし(葉)

タ:タバコガ

灌:灌注処理での登録

※トウガラシ(葉)は農薬取締法上は野菜類に分類される。葉を食用として収穫する場合、野菜類またはトウガラシ(葉)に登録がある農薬しか使用できない。

トウガラシ(葉)の登録における「使用時期(回数)」は、葉を収穫する前までの日数なので注意する。