

# ダイコン\*1 (野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	※つまみ菜・間引き菜	作用機分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	白さび病 (又はワッカ症)	白と病	白斑病	炭疽病	亀裂トニア菌(リゾクトニア菌)症	根こぶ病	黒斑細菌病	軟腐病
サンボルドー水		M1		-	-		◎						
Zボルドー水	△	M1		-	-	白	野						
マスタピース水		NC		1	-							◎	◎
スターナ水		31		14	5								◎
ハチハチ乳		39	劇	30	1	◎							
バシタック水75	×	7		21	3					◎			
アミスター20FL		11		14	3	◎							
メジャーFL	×	11		3	3	◎							
ライメイFL		21		7	4	◎							
ランマンFL		21		3	3	◎							
フロンサイドSC		29		*a	1					◎			
フロンサイド粉		29		*a	1					◎			
マイコシールド水		41		14	3								◎
リゾレックス粉	×	14		*a	1					◎			
ネビジン粉	×	36		*a	1						◎		
ピシロックFL	×	U17		1	2	◎							
バリダシン粉DL		U18		7	4					◎			
ヨネボン水		M1		7	4	白						◎	◎
ダコニール1000FL		M5		45	3	◎		◎	◎				
ユニフォーム粒	△	4・11		*a	1	白							
カセット水		31・24		14	3							◎	◎
マテリーナ水		31・25		30	2								◎
ナレート水		31・M1		21	3								◎
アミスターオブティFL		11・M5		45	3	白							
カスミンバリダシン液		24・U18		14	3								◎
カスミンボルドー水	△	24・M1		14	3	ワ						◎	◎
キンセット水	△	M1・M1		21	3								◎

\*1:ダイコン(葉ダイコン、ダイコン菜を含む)と、ハツカダイコン(ラディッシュを含む)は、使用できる農薬が異なる。ハツカダイコンの防除農薬については、「ハツカダイコン」の項を参照のこと。

\*a:播種前 白:白さび病のみの登録 ワ:ワッカ症のみの登録 野:「野菜類」での登録  
 ※つまみ菜・間引き菜に使用してはいけない農薬に「×」を、使用した場合の被害事例が公表されている農薬に「△」を付した。つまみ菜・間引き菜を収穫利用する場合には、これらの農薬を使用しないこと。印のない剤についても、使用にあたってはラベルの内容を確認し、使用基準を遵守すること。

ダイコン\*1 (野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	※つまみ菜・間引き菜	作用機 構分類 コード	人畜 毒 性	使用 時期 (日数)	使 用 回 数	ア ブ ラ ム シ 類	タ ネ グ リ バ エ 類	ハ モ グ リ バ チ 類	カ ブ ラ ハ バ チ 類	コ ナ ガ シ	ア オ ム シ	ヨ ト ウ ム シ	ハ ス モ ン ヨ ト ウ	タ マ ナ ギ ン ウ ワ バ	ネ キ リ ム シ 類	ハ イ マ ダ ラ ノ メ イ ガ	キ ス ジ ノ ミ ハ ム シ	コ ガ ネ ム シ 類 幼 虫	ネ コ ブ セ ン チ ユ ウ	ネ グ サ レ セ ン チ ユ ウ	そ の 他 害 虫
スピノエース顆水		5		7	3					◎◎							◎				
エコマスターBT		11A		*i	-											◎					
エスマルクDF		11A		*i	-											◎					
フローバックDF		11A		*i	-											◎					
バイデートL粒	×	1A	劇	*c	1	◎													◎◎		
オルトラン粒	×	1B		*c	1	◎				◎◎											
カルホス粉	×	1B		*a	1		◎								◎						
サイアノックス乳		1B		14	2	◎				◎◎	若		◎				成				
ジェイエース粒	×	1B		*c	1	◎				◎◎											
ダイアジノン粒5		1B		*a	1		◎								◎		◎				ケ
				*f	2												◎				
				*g	1											◎					
ネキリエースK粒	×	1B		*d	1									◎							
ネマキック粒		1B		*c	1															◎	
ネマトリンエース粒	×	1B		*c	1															◎◎	
マラソン乳		1B		14	6	◎		ナカ		◎											
ラグビーMC粒	×	1B		*c	1													◎	◎◎		
アグロスリン水		3A	劇	7	5	◎				◎◎◎											
アディオン乳		3A		30	4	◎				◎◎◎						◎					サ
ガードベイトA粒		3A		*b	4										◎						
サイハロン水		3A	劇	21	3	◎				◎◎◎											
トレボン乳		3A		21	3	◎				◎◎◎											
トレボンMC		3A		21	3	◎						◎									
トレボン粉剤DL		3A		21	3					◎											サ
フォース粒	×	3A	劇	*a	1		◎										◎				
				14	1													◎			
マブリック水20		3A	劇	14	2	◎				◎◎◎◎											
アドマイヤーFL		4A	劇	14	2	◎															
アドマイヤー1粒	×	4A		*a	1	◎															
アクタラ顆溶	×	4A		7	2	◎															
アクタラ粒5	×	4A		*a	1	◎															
アルバリン顆溶	×	4A		7	2	◎												◎			サ
スタークル顆溶																					
アルバリン粒	×	4A		*a	1	◎												◎			
スタークル粒							*h	1		◎										◎	

ダイコン

ダイコン\*1 (野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	※つまみ菜・間引き菜	作用機 構分類 コード	人畜 毒 性	使用 時期 (日数)	使 用 回 数	ア ブ ラ ム シ 類	タ ネ バ エ 類	ハ モ グ リ バ チ 類	カ ブ ラ ハ バ チ 類	コ ブ ラ ナ ガ シ	ア オ ム シ	ヨ ト ウ ム シ	ハ ス モ ン ヨ ト ウ	タ マ ナ ギ ン ウ ワ バ	ネ キ リ ム シ 類	ハ イ マ ダ ラ ノ メ イ ガ	キ ス ジ ノ ミ ハ ム シ	コ ガ ネ ム シ 類 幼 虫	ネ グ サ レ セ ン チ ユ ウ	そ の 他 害 虫	
ダントツ溶		4A		7	2	◎															サ
ダントツ粒		4A		*a	1	◎															
モスピラン顆溶		4A	劇	14	1	◎			カ	◎	◎						◎				サ
モスピラン粒		4A		*a	1	◎				◎											
トランスフォームFL	×	4C		1	3	◎															
フィールドマストFL	×	4E		3	2				◎	◎	◎	◎				◎	◎				サ
ディアナSC	×	5		1	2			◎	カ	◎	◎	◎		ウ		◎	◎				
アニキ乳		6		3	3				◎	◎	◎					◎					
アフーム乳		6		7	3					◎	◎					◎					
コテツFL	△	13	劇	14	2					◎	◎										サ
バダンSG溶	△	14	劇	7	3	◎	◎	◎	◎	◎							◎				サ
リーフガード顆水		14	劇	14	2	◎			カ	◎	◎					◎	◎				
アタブロン乳	△	15		14	3					◎	◎	◎	◎				◎				
カスケード乳		15		14	3					◎	◎					◎					
ノーモルト乳		15		21	2					◎	◎	◎									
マッチ乳		15		14	3					◎	◎										
ファルコンFL		18		3	3						◎	◎									
マトリックFL		18		7	3							◎				◎					
ハチハチ乳		21A	劇	30	1	◎		ナ	カ	◎	◎					◎	◎				サ
トルネードエースDF	×	22A		21	2					◎	◎	◎	◎			◎					
ファイントリムDF		22A		21	2					◎	◎	◎	◎			◎					
アクセルFL		22B		7	2				カ			◎				◎	◎				サ
アクセルバイト粒		22B		7	2										◎						
フェニックス顆水		28		7	2					◎						◎					
ブリロッツ粒オメガ	×	28	*a	1	◎				◎	◎	◎				◎	◎	◎				
ブレバゾンFL5	×	28		1	3			◎	◎	◎	◎	◎				◎					
ベネビアOD	×	28		1	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎	◎				サ
ヨーバルFL	×	28		1	3					◎	◎					◎	◎				
ウララDF	×	29		1	2	◎															
グレーシア乳		30		7	2				◎	◎	◎					◎	◎				
プロフレアSC		30		1	3					◎	◎	◎	◎			◎	◎				サ
ファインセーブFL		34	劇	14	2					◎											
プレオFL		UN		14	2				カ	◎	◎	◎									
ビーラム粒	×	-	*c	1																◎	◎

ダイコン

## ダイコン\*1 (野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	※つまみ菜・間引き菜	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(回数)	使用回数	アブラムシ類	タネバエ類	ハモグリバチ類	カブラハバチ類	コナガシ	アオムシ	ヨトウムシ	ハスモンヨトウ	タマナギンウバ	ネキリムシ類	ハイマダラノメイガ	キスジノミハムシ	コガネムシ類幼虫	ネグサレセンチュウ	ネグサレセンチュウ	その他害虫
ビーラムプライムFL	×	-		*c	1															◎◎	
アベイル粒	×	4A・28		*a	1	◎				◎◎						◎◎					
アフアームエクセラ顆水		6・15		14	3				◎◎	◎◎						◎					

\*1:ダイコン(葉ダイコン、ダイコン菜を含む)と、ハツカダイコン(ラディッシュを含む)は、使用できる農薬が異なる。ハツカダイコンの防除農薬については、「ハツカダイコン」の項を参照のこと。

\*a:播種時 \*b:播種時～生育初期 \*c:播種前 \*d:播種時または定植時  
 \*f:播種時及び生育期(但し収穫21日前まで) \*g:生育期(但し収穫21日前まで)  
 \*h:生育期(但し収穫30日前まで) \*i:発生初期(但し収穫前日まで)

ウ:ウワバ類 カ:カブラハバチ ケ:ケラ及びヒメダイコンバエ  
 サ:ダイコンサルハムシ(ダイコンハムシ) ナ:ナモグリバエ  
 若:若～中齢幼虫 成:成虫

※つまみ菜・間引き菜に使用してはいけない農薬に「×」を、使用した場合の被害事例が公表されている農薬に「△」を付した。つまみ菜・間引き菜を収穫利用する場合には、これらの農薬を使用しないこと。印のない剤についても、使用にあたってはラベルの内容を確認し、使用基準を遵守すること。

ダイコン