

ダイコン*1 (野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	※つまみ菜・間引き菜	作用機 構分類 コード	人畜 毒 性	使用 時期 (日数)	使 用 回 数	白 さ び 病 又 は ワ ッカ 症	べ と 病	白 斑 病	炭 疽 病	亀 裂 ト ニア 菌 症	根 こ ぶ 病	黒 斑 細 菌 病	軟 腐 病
サンボルドー水		M1		-	-		◎						
Zボルドー水	△	M1		-	-	白	野						
マスタピース水		NC		1	-							◎	◎
スターナ水		31		14	5								◎
ハチハチ乳		39	劇	30	1	◎							
バシタック水75	×	7		21	3					◎			
アミスター20FL		11		14	3	◎							
メジャーFL	×	11		3	3	◎							
ライメイFL		21		7	4	◎							
ランマンFL		21		3	3	◎							
フロンサイドSC		29		*a	1					◎			
フロンサイド粉		29		*a	1					◎			
マイコシールド水		41		14	3								◎
リズレックス粉	×	14		*a	1					◎			
ネビジン粉	×	36		*a	1						◎		
ピシロックFL	×	U17		1	2	◎							
バリダシン粉DL		U18		7	4					◎			
ダコニール1000FL		M5		45	3	◎		◎	◎				
ユニフォーム粒	△	4・11		*a	1	白							
カセット水		31・24		14	3							◎	◎
マテリーナ水		31・25		30	2								◎
ナレート水		31・M1		21	3								◎
アミスターオプティFL		11・M5		45	3	白							
カスミンバリダシン液		24・U18		14	3								◎
カスミンボルドー水	△	24・M1		14	3	ワ						◎	◎

ダイコン

*1:ダイコン(葉ダイコン、ダイコン菜を含む)と、ハツカダイコン(ラディッシュを含む)は、使用できる農薬が異なる。ハツカダイコンの防除農薬については、「ハツカダイコン」の項を参照のこと。

*a:播種前 白:白さび病のみの登録 ワ:ワッカ症のみの登録 野:「野菜類」での登録
 ※つまみ菜・間引き菜に使用してはいけない農薬に「×」を、使用した場合の被害事例が公表されている農薬に「△」を付した。つまみ菜・間引き菜を収穫利用する場合には、これらの農薬を使用しないこと。印のない剤についても、使用にあたってはラベルの内容を確認し、使用基準を遵守すること。

ダイコン*1 (野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	※つまみ菜・間引き菜	作用機 構分類 コード	人畜 毒 性	使用 時期 (日数)	使 用 回 数	ア ブ ラ ム シ 類	タ ネ バ エ 類	ハ モ グ リ バ チ 類	カ ブ ラ ハ バ チ 類	コ ナ ガ シ	ア オ ム シ	ヨ ト ウ ム シ	ハ ス モ ン ヨ ト ウ	タ マ ナ ギ ン ウ ワ バ	ネ キ リ ム シ 類	キ ス ジ ノ ミ ハ ム シ	コ ガ ネ ム シ 類 幼 虫	ネ コ ブ セ ン チ ユ ウ	ネ グ サ レ セ ン チ ユ ウ	そ の 他 害 虫
スピノエース顆水		5		7	3					◎	◎					◎				
エコマスターBT		11A		*i	-										◎					
エスマルクDF		11A		*i	-										◎					
フローバックDF		11A		*i	-										◎					
バイデートL粒	×	1A	劇	*c	1	◎												◎	◎	
オルトラン粒	×	1B		*c	1	◎			◎	◎										
カルホス粉	×	1B		*a	1		◎							◎						
サイアノックス乳		1B		14	2	◎			◎	◎	若		◎			成				
ジェイエース粒	×	1B		*c	1	◎			◎	◎										
ダイアジノン粒5		1B		*a	1		◎							◎		◎				ケ
				*f	2										◎					
				*g	1									◎						
ネキリエースK粒	×	1B		*d	1									◎						
ネマキック粒		1B		*c	1														◎	
ネマトリンエース粒	×	1B		*c	1													◎	◎	
マラソン乳		1B		14	6	◎		ナカ		◎										
ラグビーMC粒	×	1B		*c	1										◎		◎	◎		
アグロスリン水		3A	劇	7	5	◎			◎	◎	◎									
アディオン乳		3A		30	4	◎			◎	◎	◎			◎						サ
ガードバイトA粒		3A		*b	4									◎						
サイハロン水		3A	劇	21	3	◎			◎	◎	◎									
トレボン乳		3A		21	3	◎			◎	◎	◎									
トレボンMC		3A		21	3	◎					◎									
トレボン粉剤DL		3A		21	3					◎										サ
フォース粒	×	3A	劇	*a	1		◎								◎					
				14	1										◎					
マブリック水20		3A	劇	14	2	◎			◎	◎	◎	◎								
アドマイヤーFL		4A	劇	14	2	◎														
アドマイヤー1粒	×	4A		*a	1	◎														
アクタラ顆溶	×	4A		7	2	◎														
アクタラ粒5	×	4A		*a	1	◎														
アルバリン顆溶	×	4A		7	2	◎										◎				サ
スタークル顆溶																◎				
アルバリン粒	×	4A		*a	1	◎									◎					
スタークル粒	×	4A		*h	1		◎								◎					

ダイコン

ダイコン*¹(野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	※つまみ菜・間引き菜	作用機 構分類 コード	人畜 毒 性	使用 時期 (日数)	使 用 回 数	ア ブ ラ ム シ 類	タ バ コ 類	ハ モ グ リ バ エ 類	カ ブ ラ ハ バ チ 類	コ ナ ガ シ	ア オ ム シ	ヨ ト ウ ム シ	ハ ス モ ン ヨ ト ウ	タ マ ナ ギ ン ウ ワ バ	ネ キ リ ム シ 類	キ ス ジ ノ ミ ハ ム シ	コ ガ ネ ム シ 類 幼 虫	ネ コ ブ セ ン チ ユ ウ	ネ グ サ レ セ ン チ ユ ウ	そ の 他 害 虫
ダントツ溶		4A		7	2	◎														サ
ダントツ粒		4A		*a	1	◎														
モスピラン顆溶		4A	劇	14	1	◎			カ	◎	◎					◎				サ
モスピラン粒		4A		*a	1	◎				◎										
トランスフォームFL	×	4C		1	3	◎														
フィールドマストFL	×	4E		3	2				◎	◎	◎	◎				◎	◎			サ
ディアナSC	×	5		1	2			◎	カ	◎	◎	◎		ウ		◎	◎			
アニキ乳		6		3	3				◎	◎	◎					◎				
アフーム乳		6		7	3					◎	◎					◎				
コテツFL	△	13	劇	14	2					◎	◎									サ
パダンSG溶	△	14	劇	7	3	◎		◎	◎	◎	◎						◎			サ
リーフガード顆水		14	劇	14	2	◎			カ	◎	◎					◎	◎			
アタブロン乳	△	15		14	3					◎	◎	◎	◎				◎			
カスケード乳		15		14	3					◎	◎					◎				
ノーモルト乳		15		21	2					◎	◎	◎								
マッチ乳		15		14	3					◎	◎									
ファルコンFL		18		3	3						◎	◎								
マトリックFL		18		7	3							◎				◎				
ハチハチ乳		21A	劇	30	1	◎		ナ	カ	◎	◎					◎	◎			サ
トルネードエースDF	×	22A		21	2					◎	◎	◎	◎			◎				
ファイントリムDF		22A		21	2					◎	◎	◎	◎			◎				
アクセルFL		22B		7	2				カ			◎				◎	◎			サ
アクセルベイト粒		22B		7	2										◎					
モベントFL		23		7	3	◎					◎									
フェニックス顆水		28		7	2						◎					◎				
ブリロツ粒オメガ	×	28		*a	1	◎			◎	◎	◎				◎	◎	◎			
ブレバゾンFL 5	×	28		1	3			◎	◎	◎	◎	◎				◎				
ベネビアOD	×	28		1	3	◎		◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎			サ
ヨーバルFL	×	28		1	3					◎	◎					◎	◎			
ウララDF	×	29		1	2	◎														
グレーシア乳		30		7	2				◎	◎	◎					◎	◎			
プロフレアSC		30		1	3				◎	◎	◎	◎				◎	◎			サ
ファインセーブFL		34	劇	14	2					◎										
ブレオFL		UN		14	2				カ	◎	◎	◎								

ダイコン

ダイコン*1 (野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	※つまみ菜・間引き菜	作用機構分類コード	人畜毒毒性	使用時期(日数)	使用回数	アブラムシ類	タネバエ類	ハマグリバチ類	カブラハバチ類	コナガ	アオムシ	ヨトウムシ	ハスモンヨトウ	タマナギンウバ	ネキリムシ類	ハイマダラノメイガ	キスジノミハムシ	コガネムシ類幼虫	ネコブセンチュウ	ネグサレセンチュウ	その他害虫
ビーラム粒	×	-		*c	1														◎	◎	
ビーラムプライムFL	×	-		*c	1														◎	◎	
アベイル粒	×	4A・28		*a	1	◎			◎	◎						◎	◎				
アフームエクセラ顆水		6・15		14	3				◎	◎					◎						

*1:ダイコン(葉ダイコン、ダイコン菜を含む)と、ハツカダイコン(ラディッシュを含む)は、使用できる農薬が異なる。ハツカダイコンの防除農薬については、「ハツカダイコン」の項を参照のこと。

*a:播種時 *b:播種時～生育初期 *c:播種前 *d:播種時または定植時
 *f:播種時及び生育期(但し収穫21日前まで) *g:生育期(但し収穫21日前まで)
 *h:生育期(但し収穫30日前まで) *i:発生初期(但し収穫前日まで)

ウ:ウワバ類 カ:カブラハバチ ケ:ケラ及びヒメダイコンバエ
 サ:ダイコンサルハムシ(ダイコンハムシ) ナ:ナモグリバエ
 若:若～中齢幼虫 成:成虫

※つまみ菜・間引き菜に使用してはいけない農薬に「×」を、使用した場合の薬害事例が公表されている農薬に「△」を付した。つまみ菜・間引き菜を収穫利用する場合には、これらの農薬を使用しないこと。印のない剤についても、使用にあたってはラベルの内容を確認し、使用基準を遵守すること。

ダイコン