

## ナバナ類\*1 (野菜類、非結球アブラナ科葉菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	使用条件	べと病	黒斑病	白斑病	菌核病	白さび病	根こぶ病	黒腐病	軟腐病
カンタスDF	7		7	1					◎				
バレード20FL	7		1	2					◎				
			*f	1	☆				◎				
ストロビーFL	11		1	2		◎			◎				
アリエッティ水	P7		1	2						な			
ネビジン粉	36		*a								◎		
			*d	1							◎		
			*e									◎	
ランマンFL	21		3	3						◎			
			*b	1	☆						◎		
フロンサイド粉	29		*a	1							◎		
カスミン液	24		14	3									◎
ダコニール1000FL	M5		*c	3		な	な	な		な			
			60	3		ナ	ナ	ナ		ナ			
カップーシン水	24・M1		14	3								◎	

\*1:ナバナ類…「農薬登録における適用作物名について」(P. 58)を参照のこと。

\*a:播種又は定植前 \*b:定植前日～当日 \*c:出蕾前(但し収穫21日前まで)

\*d:播種前 \*e:定植前 \*f:定植当日

な:なばなのみに適用

ナ:なばなを除く

☆:セル成型育苗トレイまたはペーパーポットで育苗している苗に灌注処理する。

ナバナ類\*<sup>1</sup>(野菜類、非結球アブラナ科葉菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(回数)	使用回数	使用条件	アブラムシ類	アザミウマ類	ハマグリバエ類	カブラハバチ	コマナガ	ハイマダラノメイガ	アオムシ	ヨトウムシ類	シロイチモジヨトウ	ハスモンヨトウ	ネキリムシ類	キスジノミハムシ	ハマグリバエ類	コガネムシ類	ケハクサイダニ	
ダイアジノン粒5	1B		*b	1												ハ		ハ	ハ		
			*b	1													は		は	は	
			*c															は			
アディオソ乳	3A		1	3					◎	◎											
ガードベイトA粒	3A		*d	3											◎						
スカウトFL	3A	劇	7	2									ヨ								
アドマイヤー顆水	4A		7	2		◎															
モスピラン顆溶	4A	劇	14	1		◎		◎									◎				
ディアナSC	5		1	2		◎			◎						◎		◎			◎	
アフーム乳	6		7	2					◎	◎	◎	ヨ		◎							
コテツFL	13	劇	3	2										◎							
パダンSG溶	14	劇	7	3		◎			◎												
カスケード乳	15		21	3			◎						◎	○							
ブリロソ粒オメガ	28		*c	1		◎															
ブレバソソFL5	28		*a	1	☆						◎										
				1	3			◎	◎	◎		◎									
ブレオFL	UN		14	2					◎				◎	◎							
ジュリボFL	4A・28		*a	1	☆	◎				◎	◎			◎							

\*1:ナバナ類…「農薬登録における適用作物名について」(P.58)を参照のこと。

\*a:育苗後半～定植当日 \*b:播種時 \*c:定植時 \*d:生育初期

は:はなっこりとなばなに適用

ハ:はなっこりとなばなを除く

ヨ:ヨトウムシ

☆:セル成型育苗トレイまたはペーパーポットで育苗している苗に灌注処理する。

ナ  
バ  
ナ  
類