

ナバナ類^{*1} (野菜類、非結球アブラナ科葉菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(回数)	使用回数	使用条件	べと病	黒斑病	白斑病	菌核病	白さび病	根こぶ病	黒腐病	軟腐病
カンタスDF	7		7	1					◎				
ストロビーFL	11		1	2			◎			◎			
アリエッティ水	P7		1	2						な			
ネビジン粉	36		*a	1							◎		
			*d						◎				
			*e						◎				
ランマンFL	21		3	3						◎			
			*b	1	☆						◎		
フロンサイド粉	29		*a	1							◎		
カスミン液	24		14	3									◎
ヨネボン水	M1		14	3						◎			◎
ダコニール1000FL	M5		*c	3		な	な	な		な			
				60	3		ナ	ナ	ナ		ナ		
カッパーシン水	24・M1		14	3								◎	

*1:ナバナ類…「農薬登録における適用作物名について」(P.58)を参照のこと。

*a:播種又は定植前 *b:定植前日～当日 *c:出蕾前(但し収穫21日前まで)

*d:播種前 *e:定植前

な:なばなのみに適用

ナ:なばなを除く

☆:セル成型育苗トレイまたはペーパーポットで育苗している苗に灌注処理する。

ナバナ類*1 (野菜類、非結球アブラナ科葉菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機 構分類 コード	人 畜 毒 性	使 用 時 期 (日 数)	使 用 回 数	使 用 条 件	ア ブ ラ ム シ 類	ア ザ ミ ウ マ 類	ハ モ グ リ バ エ 類	カ ブ ラ ハ バ チ	コ ナ ガ	ハ イ マ ダ ラ ノ メ イ ガ	ア オ ム シ	ヨ ト ウ ム シ 類	ハ ス モ ン ヨ ト ウ	ネ キ リ ム シ 類	キ ス ジ ノ ミ ハ ム シ	コ ガ ネ ム シ 類 幼 虫	ケ ラ	ハ ク サ イ ダ ニ	
ダイアジノン粒5	1B		*b	1																
			*b	1												ハ	ハ	ハ		
			*c													ハ				
アディオソ乳	3A		1	3					◎		◎									
ガードベイトA粒	3A		*d	3											◎					
スカウトFL	3A	劇	7	2									ヨ							
アドマイヤー顆水	4A		7	2		◎														
モスピラン顆溶	4A	劇	14	1		◎			◎							◎				
ディアナSC	5		1	2			◎			◎				◎						◎
ラディアントSC	5		1	2			◎			◎				◎						◎
アフーム乳	6		7	2						◎	◎	◎	ヨ	◎						
コテツFL	13	劇	3	2										◎						
カスケード乳	15		21	3				◎						◎	○					
プリロソ粒オメガ	28		*c	1		◎														
プレバソソFL5	28		*a	1	☆							◎								
			1	3			◎		◎		◎		◎							
プレオFL	UN		14	2						◎				◎						
ジュリボFL	4A・ 28		*a	1	☆	◎				◎		◎		◎						

*1:ナバナ類…「農薬登録における適用作物名について」(P.58)を参照のこと。

*a:育苗後半～定植当日 *b:播種時 *c:定植時 *d:生育初期

ハ:はなっこりーとなばなに適用

ハ:はなっこりーとなばなを除く

ヨ:ヨトウムシ

☆:セル成型育苗トレイまたはペーパーポットで育苗している苗に灌注処理する。