

モロヘイヤ(野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	灰色かび病	黒星病	炭疽病	アブラムシ類	コナジラミ類	カメムシ類	アザミウマ類	ハスモンヨトウ	マメコガネ	ハダニ類
アミスター20FL	11		1	4	◎	◎								
ストロビーFL	11		1	2			◎							
スピノエース顆水	5		3	3							◎			
コロマイト乳	6		1	1										◎
スミチオン乳	1B		14	2				◎		◎	◎		◎	
トレボン乳	3A		14	1							◎			
アクトラ顆溶	4A		7	3							ギ			
アドマイヤーFL	4A	劇	14	1							◎			
ベストガード溶	4A		7	3					◎					
モスピラン顆溶	4A	劇	21	1					◎					
アフアーム乳	6		1	3								◎		
コテツFL	13	劇	7	1							◎			
カスケード乳	15		7	2								◎		
ダニトロンFL	21A		7	1										◎
ブレバソンFL5	28		1	2								◎		

ギ:ネギアザミウマ

病害虫名	防除時期	防除方法	参考事項
アザミウマ類	生育期	・発生を見たら次の薬剤のいずれかを散布する。 アクトラ顆粒水溶剤# 2000倍 アドマイヤーフロアブル 2000倍 コテツフロアブル 2000倍 スピノエース顆粒水和剤 5000倍 トレボン乳剤 1000倍	#ネギアザミウマのみの登録
マメコガネ	生育期	・発生を見たら次の薬剤を散布する。 スミチオン乳剤 1000倍	
ハダニ類	生育期	・発生を見たら次の薬剤のいずれかを散布する。 コロマイト乳剤 1500倍 ダニトロンフロアブル 2000倍	
その他の病害虫		苗立枯病、変形菌病	