

## モロヘイヤ(野菜類の登録農薬も使用できる)

| 薬剤名       | 作用機構分類コード | 人畜毒性 | 使用時期(日数) | 使用回数 | 灰色かび病 | 黒星病 | 炭疽病 | アブラムシ類 | コナジラミ類 | カメムシ類 | アザミウマ類 | ハスモンヨトウ | マメコガネ | ハダニ類 |
|-----------|-----------|------|----------|------|-------|-----|-----|--------|--------|-------|--------|---------|-------|------|
| アミスター20FL | 11        |      | 1        | 4    | ◎     | ◎   |     |        |        |       |        |         |       |      |
| ストロビーFL   | 11        |      | 1        | 2    |       |     | ◎   |        |        |       |        |         |       |      |
| スピノエース顆水  | 5         |      | 3        | 3    |       |     |     |        |        |       | ◎      |         |       |      |
| コロマイト乳    | 6         |      | 1        | 1    |       |     |     |        |        |       |        |         |       | ◎    |
| スミチオン乳    | 1B        |      | 14       | 2    |       |     |     | ◎      |        | ◎     | ◎      |         | ◎     |      |
| トレボン乳     | 3A        |      | 14       | 1    |       |     |     |        |        |       | ◎      |         |       |      |
| アクタラ顆溶    | 4A        |      | 7        | 3    |       |     |     |        |        |       | ギ      |         |       |      |
| アドマイヤーFL  | 4A        | 劇    | 14       | 1    |       |     |     |        |        |       | ◎      |         |       |      |
| ベストガード溶   | 4A        |      | 7        | 3    |       |     |     |        | ◎      |       |        |         |       |      |
| モスピラン顆溶   | 4A        | 劇    | 21       | 1    |       |     |     |        | ◎      |       |        |         |       |      |
| アフファーム乳   | 6         |      | 1        | 3    |       |     |     |        |        |       |        | ◎       |       |      |
| コテツFL     | 13        | 劇    | 7        | 1    |       |     |     |        |        |       | ◎      |         |       |      |
| カスケード乳    | 15        |      | 7        | 2    |       |     |     |        |        |       |        | ◎       |       |      |
| ダニトロンFL   | 21A       |      | 7        | 1    |       |     |     |        |        |       |        |         |       | ◎    |
| プレバソンFL5  | 28        |      | 1        | 2    |       |     |     |        |        |       |        | ◎       |       |      |

ギ:ネギアザミウマ

| 病害虫名    | 防除時期 | 防除方法   | 参考事項          |
|---------|------|--|---------------|
| アザミウマ類  | 生育期  | ・発生を見たら次の薬剤のいずれかを散布する。<br>アクタラ顆粒水溶剤# 2000倍<br>アドマイヤーフロアブル 2000倍<br>コテツフロアブル 2000倍<br>スピノエース顆粒水和剤 5000倍<br>トレボン乳剤 1000倍 | #ネギアザミウマのみの登録 |
| マメコガネ   | 生育期  | ・発生を見たら次の薬剤を散布する。<br>スミチオン乳剤 1000倍   |               |
| ハダニ類    | 生育期  | ・発生を見たら次の薬剤のいずれかを散布する。<br>コロマイト乳剤 1500倍<br>ダニトロンフロアブル 2000倍  |               |
| その他の病害虫 |      | 苗立枯病、変形菌病  |               |

モロヘイヤ