

アシタバ（野菜類、セリ科葉菜類の登録農薬も使用できる）

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期（日数）	使用回数	葉枯病	黒枯病	アブラムシ類	キアゲハ	ウドノメイガ	ハダニ類
ロブラール水	2		7	3	◎					
ダコニール 1000FL	M5		30	3		◎				
コロマイト乳	6		1	1						◎
マラソン乳	1B		7	3					◎	
トレボン乳	3A		14	3			◎			
モスピラン顆粒	4A	劇	1	3			◎	◎		
コテツ FL	13	劇	7	2					◎	

病害虫名	防除時期	防除方法	参考事項
葉枯病	生育期	・発生を見たら次の薬剤を散布する。 ロブラール水和剤 1000倍	
ウドノメイガ	生育期	・発生を見たら次の薬剤のいずれかを散布する。 コテツフロアブル 2000倍 マラソン乳剤 1000倍	
ナメクジ類	生育期	1. 圃場内の落ち葉や枯れ草を除去する。 2. 圃場周辺の雑草地の土壌表面に次の薬剤を散布する。 マイキラー（FL）*1 3. 発生前～発生初期に次の薬剤を散布する。 クプロシールド（FL）*2 4. 発生を見たら次の薬剤を散布する。 スラゴ（粒）*3	*1ナメクジ類、カタツムリ類、が加害する農作物等での登録。 *2野菜類での登録。 *3ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイ、ヒメシロマイマイが加害する農作物等での登録。
その他の病害虫		ヤマトフキバッタ、クロモンキノメイガ、ハナウドモグリガ、ネギアザミウマ	