

ニンニク(野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機 構分類 コード	人畜 毒害 性	使用 時期 (日数)	使用 回数	葉 枯 病	白 斑 病	黒 腐 菌 核 病	春 腐 病	さ び 病	白 網 斑 病	黄 斑 病	ア ザ ミ ウ マ 類	ア ブ ラ ム シ 類	ネ ギ コ ガ	チ ユ ー リ ッ プ サ ビ ダ ニ	イ モ グ サ レ セ ン チ ユ ウ
コサイド3000DF	M1		-	-				◎								
I Cボルドー66D水	M1		-	-	◎			◎								
Zボルドー水	M1		-	-	◎			◎								
アフエットFL	7		1	3	◎				◎							
			*a	1				塗								
パレード20FL	7		1	2	◎											
			*a	1				塗								
アミスター20FL	11		7	3	◎					◎						
ストロビーFL	11		7	3						◎						
ファンタジスタ顆水	11		7	3	◎	◎				◎		◎				
メジャーFL	11		*c	3	◎					◎		◎				
スミレックス水	2		*a	1			◎									
オンリーワンFL	3		7	3	◎	◎				◎		◎				
トリフミン水	3		1	3	◎											
			*a	1				◎								
			*d	2								◎				
ラリー乳	3		3	3						◎						
バリダシン液5	U18		3	5				◎								
ジマンダイセン水	M3		7	5	◎	◎										
ベンコゼブ水	M3		7	5	◎											
ダコニール100FL	M5		7	6	◎	◎				◎		◎				
ベルコート水	M7		3	3	◎											
カセット水	31・24		7	2				◎								
ナレート水	31・M1		7	2				◎								
シグナムWDG	7・11		3	3	◎	◎				◎		◎				
ベジセイバーFL	7・M5		7	3												
カスミンボルドー水	24・M1		7	5				◎								
アグリマイシン-100水	25・41		7	3				◎								
テーク水	3・M3		7	3	◎	◎				◎						
ベンレートT水20(○)	1・M3		*a	1				◎								◎
ホームイ水	1・M3		*a	1				◎								◎
ハチハチ乳	39・21A	劇	7	2					◎			◎	◎	◎	◎	
エコマスターBT	11A		*b	-												
フローバックDF	11A		*b	-												
オルトラン水	1B		7	2								◎	◎	◎		
ガードホープ液	1B	劇	*a	1												浸
			60	1												灌
ジェイエース溶	1B		7	2									◎	◎		
ダイアジノン水34	1B	劇	14	3										◎		
			*a	1												浸
トクチオン乳	1B		14	3								◎		◎	◎	
			*a	1												◎
ネマトリンエース粒	1B		*a	1												◎
アディオン乳	3A		1	2									◎	◎		
マブリック水20	3A	劇	3	2									◎	◎		
モスピラン顆溶	4A	劇	1	2								◎	◎	◎		
ディアナSC	5		1	2								◎		◎		
モベントFL	23		14	2												◎
ベネビアOD	28		7	3								◎	◎	◎		
			7	1												◎
グレーシア乳	30		*e	1												◎
			*a	1								◎				
ファインセーブFL	34	劇	1	2								◎				
ヒーラム粒	-		*a	1												◎

\*a:植付前 \*b:発生初期(但し収穫前日まで) \*c:抽苔始めから収穫前日  
\*d:土寄せ時(但し、収穫75日前まで)(茎葉展開期) \*e:植え付け前120分間鱗片浸漬  
浸:種球浸漬 灌:土壌灌注 塗:種球塗布