

ニンニク (野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機 構分類 コード	人畜 毒 性	使用 時期 (日数)	使用 回数	葉 枯 病	白 斑 病	黒 腐 菌 核 病	春 腐 病	さ び 病	白 絹 病	黄 斑 病	ア ザ ミ ウ マ 類	ア ブ ラ ム シ 類	ハ モ グ リ バ エ 類	ネ ギ コ ガ	チ ュー リ ッ プ サ ビ ダ ニ	イ モ グ サ レ セ ン チ ュ ウ
コサイド3000DF	M1		-	-				◎									
ICボルドー66D水	M1		*f	-	◎			◎									
Zボルドー水	M1		-	-	◎			◎	◎								
アフエットFL	7		1	3	◎				◎								
カナメFL	7		*a	1				塗									
パレード20FL	7		1	2	◎				◎	◎							
アマスター20FL	11		*a	1				塗									
ストロビーFL	11		7	3	◎				◎								
ファンタジスタ顆水	11		7	3	◎	◎			◎		◎						
メジャーFL	11		*c	3	◎				◎	◎							
スマレックス水	2		*a	1			◎										
オンリーワンFL	3		7	3	◎	◎			◎		◎						
トリフミン水	3		1	3	◎												
モンガリット粒	3		*a	1			◎										
ラー乳	3		*d	2						◎							
フロンサイドSC	29		3	3					◎								
バリダシン液5	U18		1	1						◎						◎	
ジマンダイセン水	M3		3	5	◎	◎			◎								
ベンコゼブ水	M3		7	5	◎												
ダコニール1000FL	M5		7	6	◎	◎					◎						
ベルコート水	M7		3	3	◎												
カセット水	31・24		7	2					◎								
ナレート水	31・M1		7	2					◎								
シグナムWDG	7・11		3	3	◎	◎			◎		◎						
バジセイバーFL	7・M5		7	3					◎								
カスミンボルドー水	24・M1		7	5					◎								
アグリマイシン-100水	25・41		7	3					◎								
テーク水	3・M3		7	3	◎	◎			◎								
ベンレートT水20	1・M3		*a	1			◎										◎
ホームイ水	1・M3		*a	1			◎										◎
ハチハチ乳	39・21A	劇	7	2					◎		◎	◎			◎	◎	
エコマスターBT	11A		*b	-											◎		
フローバックDF	11A		*b	-											◎		
オルトラン水	1B		7	2							◎	◎			◎		
ガードホープ液	1B	劇	*a	1													浸
ジェイエース溶	1B		60	1													灌
ダイアジノン水34	1B	劇	7	2								◎			◎		
トクチオン乳	1B		*a	1											◎		浸
ネマトリンエース粒	1B		14	3							◎				◎		◎
アデオ乳	3A		*a	1											◎		
マブリック水20	3A	劇	1	2								◎	◎		◎		
モスピラン顆溶	4A	劇	3	2								◎	◎		◎		
ディアナSC	5		1	2								◎	◎		◎		
モベントFL	23		14	2												◎	
ベネビアOD	28		7	3								◎	◎		◎		
グレーシア乳	30		7	1								◎		◎			
ファインセーブFL	34	劇	*e	1								◎				◎	
ビーラム粒	-		*a	1								◎					◎

*a: 植付前 *b: 発生初期 (但し収穫前日まで) *c: 抽苔始めから収穫前日
 *d: 土寄せ時 (但し、収穫75日前まで) (茎葉展開期) *e: 植え付け前120分間鱗片浸漬
 浸: 種球浸漬 灌: 土壤灌注 塗: 種球塗布 *f: 発病前~発病初期