

未成熟ソラマメ

(野菜類、豆類(未成熟)の登録農薬も使用できる。豆類(種実)の登録農薬は使用不可)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用回数	使用時期(回数)	疫病	さび病	苗立枯病(リゾクトニア菌)	立枯病	赤斑点病	灰色核病	炭疽病	茎腐病	輪紋病	アブラムシ	カメムシ	アザミウマ	ダイズヤタバエ	ハモグリバエ	マメシバエ	マメヒメヤマイガ	アズキノメイガ	シロイチモジダラメイガ	ヨトウミシジミ	ウラナミシジミ
Zボルドー水	M1	-	-	-					◎															
タチガレン液	32	*a	3				◎																	
カナメFL	7	劇	1	4	◎				◎	◎														
カンタスDF	7		1	3	◎				◎															
アミスター20FL	11		3	3	◎																			
ファンタジスタ顆水	11		1	3	◎				◎	◎	◎													
ロブラール水	2		1	3					◎															
リゾレックス水	14		1	2									株											
オンリーワンFL	3		1	2			土																	
ジマンダイセン水	M3		30	3	◎								◎											
リドミルゴールドMZ	4・M3		30	3	◎																			
ゲッター水㊟	10・1		1	3								◎												
スミチオン乳	1B		3	3										◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
アディオン乳	3A		7	3										◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
アドマイヤー1粒	4A		*b	1										◎										
アドマイヤーFL	4A	劇	*d	3										◎										
アドマイヤー顆水	4A	劇	*d	3										◎										
カスケード乳	15		1	3														マ					ハ	
ブレバソソFL5	28		1	3														◎						
プロフレアSC	30		1	3																				シ

㊟: チオファネートメチル含有剤 ◎: ペノミル含有剤 ㊟を使用した場合には同じ作での◎は使用しないこと。その逆も同様(種子への処理および塗布処理を除く、詳細はP. 856参照)。

*a: 播種後及び生育期(但し収穫30日前まで) *b: 播種時 *c: 定植時

*d: 収穫7日前まで(但し露地栽培については開花期終了後から)

マ: マメハモグリバエ ハ: ハスモンヨトウ シ: ハスモンヨトウとシロイチモジヨトウ

株: 株元灌注 土: 土壌灌注

未成熟ソラマメ