

小粒核果類\*1 (作物群登録)(果樹類、落葉果樹の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒毒性	使用時期(回数)	使用回数	かいよび病	灰色病	灰色星病	黒星病	黒粒枝枯病	環紋葉枯病	葉炭疽病	すす斑病	すす点病	白紋羽病	ゆめ合促進
クプロシールドFL	M1		*a	-	◎										
マスタピース水	NC		1	-	◎										
園芸ボルドー	M1・M2		*d	-	◎										
スターナ水	31		7	3	ス										
トップジンM水㊦	1		21	3			◎	◎	◎	◎	◎	う			
トップジンMペースト	1		*b	3											◎
アフエットFL	7		1	3			◎	◎							
カナメFL	7	劇	1	3			◎	◎				う			
パレード15FL	7		1	2		◎	す	◎				う			
フルーツセイバーFL	7		1	3			◎	◎		◎		う	す		
ロンセラールFL	7		1	3		◎	◎	◎				う			
スクレアFL	11		1	3				ウ							
ストロビーDF	11		7	3						ア					
ファンタジスタ顆水	11		1	2			ウ	ウ							
フリントFL25	11		1	2			ス								
フロンサイドSC	29		*c	1											ウ
オーシャインFL	3		1	3			ウ								
オンリーワンFL	3		1	3			ウ	ウ							
サンリット水	3		1	3			◎								
オーソサイド水80	M4		21	3				◎				◎			
ベルコートFL	M7		30	3			ア								
ベルコート水	M7		30	3		ア	ア	ア		ア		ア			
ナリアWDG	7・11		7	2				ア							

㊦: チオファネートメチル含有剤 ◎: ベノミル含有剤 ㊦を使用した場合には同じ作での◎は使用しないこと。その逆も同様(種子への処理および塗布処理を除く、詳細はP. 857 参照)。

\*1: 小粒核果類…あんず(アプリコット)、うめ、すもも(プラム、ブルー)

\*a: 葉芽発芽前まで \*b: 剪定整枝時、病患部削り取り直後、及び病枝切除後

\*c: 収穫後から開花前まで(但し収穫60日前まで) \*d: 収穫後～発芽前

ア: うめ、すももを除く ウ: うめを除く ス: すももを除く

う: うめで登録

す: すももで登録

小粒核果類\*1 (作物群登録)(果樹類、落葉果樹の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機 構分類 コード	人畜 毒性	使用 時期 (日数)	使 用 回 数	ア ブ ラ ム シ 類	カ イ ガ ラ ム シ 類	モ モ ヒ メ ヨ コ バ イ 類	カ メ ム シ 類	イ ラ ガ シ 類	ケ ム シ 類	ア メ リ カ シ ロ ヒ ト リ 類	コ ス カ シ バ 類	ハ マ キ ム シ 類	シ ン ク イ ム シ 類	キ ク イ ム シ 類	ク ビ ア カ ツ ヤ カ ミ キ リ 類	ハ ダ ニ 類	
コロマイト乳	6		1	1														◎
アタックオイル	UNM		*a	-		◎												
ハーベストオイル	UNM		*a	-		◎												
オリオン水40	1A	劇	7 *c	3	ウ					ウ	ウ							ウ
ガットキラール	1B		*b	1								ア				ア		
ダイアジノン水34	1B	劇	21	2	ス						ス		ス	ス				
アーデントFL	3A		1	3											◎			◎
スカウトFL	3A	劇	14	1	ア													
テルスターFL	3A	劇	1	2	◎			◎							◎			
バイスロイドEW	3A	劇	14	2	◎													
アクタラ顆溶	4A		7	2	ウ													ウ
アルバリン顆溶 スタークル顆溶	4A		1	3	◎			◎							◎			
バリアード顆水	4A	劇	1	2	ア										ア			
モスピラン顆溶	4A	劇	1	3	ア	ア												ア
トランスフォームFL	4C		3	3	◎	◎												
ディアナWDG	5		1	2									ア					
デリゲートWDG	5		1	2									ア					
コルト顆水	9B		1	3	◎	◎												
コテツFL	13	劇	1	2		カ			◎									オ
カスケード乳	15		14	2						◎	◎							
ロムダンFL	18		1	2						◎	◎							
マイトコーネFL	20D		3	1														◎
ダニゲッターFL	23		1	1														◎
モベントFL	23		7	3	◎	◎												◎
スターマイトFL	25A		1	1														◎
ダニサラバFL	25A		1	2														◎
ダニコングFL	25B		1	1														ナ
テッパン液	28		1	2			◎			◎	◎		◎	◎				◎
フェニックスFL	28		1	2						ア	ア	ア						
ヨーバルFL	28		1	2						ス	ス							
ウララDF	29		7	2	◎		◎											
グレーシアFL	30		14	2						◎								
ダニオーテFL	33		1	1														◎

\*1:小粒核果類…あんず(アブリコット)、うめ、すもも(ブラム、ブルー)

\*a:発芽前 \*b:休眠期(落葉後～萌芽前) \*c:成虫発生期(但し収穫7日前まで)

ア:ウメ、スモモを除く ウ:ウメを除く オ:オウトウハダニ

カ:ウメシロカイガラムシ ス:スモモを除く ナ:ナミハダニ