

ブルーベリー（果樹類、落葉果樹、ベリー類の登録農薬も使用できる）

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒	使用時期（回数）	うどんこ病	斑点病	すすび病	灰色カビ病	バルデンシア葉枯病	白紋羽病	根腐疫	アザミウマ類	アブラムシ類	カイガラムシ類	ケムシ類	マユクガ	ドクガ	イラガ	ハマキムシ類	オウトウシヨウジョウバエ	ブルーベリータマバエ	コガネムシ類幼虫
カリグリーン溶	NC		1	-	◎		◎														
アグロケア水	BM2		1	-			◎														
エコショット顆水	BM2		1	-			◎														
ベンレート水⊕	1		7	1	◎		◎														
ストロビーDF	11		14	2	◎		◎														
フロンサイドSC	29		21	1					◎	◎											
インダーFL	3		14	1			◎														
オーソサイド水80	M4		21	2	◎	◎	◎														
オキシラン水	M1・M4	*e	3		◎																
デルフィン顆水	11A	*c	-															◎			
スプレーオイル	UNM	*d	-										ミ								
ラビサンスプレー	UNM	*d	-										◎								
サイアノックス水	1B		30	2											◎	◎					
ダイアジノン粒5	1B		14	2																	◎
アディオンFL	3A		1	2																◎	
スカウトFL	3A	劇	1	2														ロ		◎	
ダントツ溶	4A		45	3							◎	◎		◎	◎					◎	
モスピラン顆溶	4A	劇	1	1																◎	
ディアナWDG	5		1	2							◎								◎	◎	◎
デリゲートWDG	5		1	2							◎								◎	◎	◎
コテツFL	13	劇	1	3														◎		◎	
エクシレルSE	28		1	3							◎	◎		◎	◎					◎	
テッパン液	28		1	2																◎	◎
フェニックスFL	28		1	2																	

⊕：チオファネートメチル含有剤 ⊖：ベノミル含有剤 ⊕を使用した場合には同じ作での⊖は使用しないこと。その逆も同様（種子への処理および塗布処理を除く、詳細はP.857 参照）。

*c: 発生初期（但し収穫前日まで）

*d: 発芽前

*e: 収穫終了後～落葉期まで

ミ：ミズキカタカイガラムシ ロ：ヒロヘリアオイラガ