

ブルーベリー(果樹類、落葉果樹、ベリー類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機 構分類 コード	人畜 毒 性	使用 時期 (回数)	使用 回数	うどん こ 病	斑 点 病	すす び 病	灰 色 か び 病	バル デン シ ア 葉 枯 病	白 紋 羽 病	根 腐 疫 病	ア ザ ミ ウ マ シ 類	ア ブ ラ ム シ 類	カ イ ガ ラ ム シ 類	ケ ム シ 類	マ イ マ ク ガ 類	ド ク ガ 類	イ ラ キ ム シ 類	ハ マ キ ム シ 類	オ ウ ト ウ シ ョ ウ ジ ョ ウ バ エ	ブ ル ー ベ リ ー タ マ バ エ	コ ガ ネ ム シ 類 幼 虫
カリグリーン溶	NC		1	-	◎			◎														
アグロケア水	BM2		1	-				◎														
エコショット顆水	BM2		1	-				◎														
ベンレート水⊙	1		7	1		◎			◎													
ストロビーDF	11		14	2		◎		◎														
フロンサイドSC	29		21	1						◎	◎											
インダーFL	3		14	1				◎														
オーソサイド水80	M4		21	2		◎	◎	◎														
オキシラン水	M1・M4	*e	3		◎																	
デルフィン顆水	11A	*c	-																◎			
スプレーオイル	UNM	*d	-											ミ								
ラビサンスプレー	UNM	*d	-											◎								
サイアノックス水	1B		30	2												◎	◎					
ダイアジノン粒5	1B		14	2																		◎
アディオンFL	3A		1	2																	◎	
スカウトFL	3A	劇	1	2																ロ	◎	
ダントツ溶	4A		45	3								◎	◎		◎	◎	◎				◎	
モスピラン顆溶	4A	劇	1	1																	◎	
ディアナWDG	5		1	2								◎								◎	◎	◎
デリゲートWDG	5		1	2								◎								◎	◎	◎
コテツFL	13	劇	1	3																◎	◎	
エクシレルSE	28		1	3								◎	◎		◎	◎	◎				◎	
テッパン液	28		1	2																	◎	◎
フェニックスFL	28		1	2											◎	◎	◎					

⊕: チオファネートメチル含有剤 ⊖: ベノミル含有剤 ⊗: 使用した場合には同じ作での
 ⊙は使用しないこと。その逆も同様(種子への処理および塗布処理を除く)。

*c: 発生初期(但し収穫前日まで)

*d: 発芽前

*e: 収穫終了後～落葉期まで

ミ: ミズキカタカイガラムシ ロ: ヒロヘリアオイラガ

ブルーベリー