

クリ(果樹類、落葉果樹の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒毒性	使用時期(回数)	使用回数	芽枯病	胴枯病	実炭疽病	ゆ合促進	アブラムシ類	カイガラマバチ	クリタマバチ	モモノゴマダラノメイガ	ネスジキノカワガ	コウモリガ	クリミサガ	クスイムシ類	カミキリムシ類	クリシギゾウムシ
ドイツポルダーA水	M1		*b	-			◎											
石灰硫黄合剤	M2		*a	-	◎													
トップジンM水㊦	1			3	4		◎											
トップジンMペースト㊦	1		*d *j	3		◎		◎										
ベンレート水㊧	1		*g	4			◎											
ジマンダイセン水	M3			7	2		◎											
ベルコートFL	M7			14	2		◎											
アタックオイル	UNM		*a	-					◎									
ガットサイドS乳	1B		*f *L	1									◎			◎		
スミチオン水40	1B		*g	4						◎	◎			◎				
アーケリン水	3A			14	3													◎
アグロスリン水	3A	劇		7	5					◎								◎
アディオン乳	3A			14 *k	5					◎								◎
マブリック水20	3A	劇		7	2				ク	◎								◎
アドマイヤー水	4A	劇	*n		3				◎									
モスピラン顆粒	4A	劇		7	3				◎	◎		◎		◎				◎
ディアナWDG	5			1	2							◎						
デリゲートWDG	5			1	2							◎						
パダンSG溶	14	劇	*c		3							◎	◎					
アブロード水	16			7	2					幼								
フェニックスFL	28			1	2							◎			◎			
トラサイドA乳	1B・1B		*e *g	1	1					◎								◎
パーマチオン水	1B・3A	劇	*g		4				ク									◎

㊦:チオファネートメチル含有剤 ㊧:ベノミル含有剤 ㊦を使用した場合には同じ作での㊧は使用しないこと。その逆も同様(種子への処理および塗布処理を除く)。*a:発芽前 *b:果実肥大期 *c:裂果前 *d:剪定整枝時、病患部削り取り直後及び病枝切除後 *e:発芽直前 *f:3~5月(産卵初期) *g:裂果前(但し収穫14日前まで) j:病患部削り取り直後 *k:羽化脱出期(但し収穫14日前まで) *L:裂果前(但し収穫90日前まで) *n:収穫7日前まで(但し露地栽培については発芽期から開花期を除く)
カ:カツラマルカイガラムシ ク:クリイガアブラムシ 幼:幼虫

ク
リ

クリ (果樹類、落葉果樹の登録農薬も使用できる)

病害虫名	防除時期	防除方法	参考事項
胴枯病		<ol style="list-style-type: none"> 1. 密植、肥切れなどにならないように栽培管理につとめる。 2. 草生栽培として下草管理を励行する。 3. 枯死枝、剪定枝は伝染源となるので、園内に放置しない。 4. 枯死枝・病患部は削り取り、傷口、切り口にはトップジンMペーストを塗り保護する。 	<p>一般に若木では接木部を中心に発病する。</p>
実炭疽病		<ol style="list-style-type: none"> 1. 発生の少ない品種を栽培する。 2. 密植をさけ、整枝、間伐を励行する。 3. 果実害虫を防除する。 	<p>丹沢、伊吹、筑波などにでやすい。 成木にでやすく、幼木に少ない。 雨の多い年にでやすい。</p>
	7月中旬～8月下旬	<p>・次の薬剤のいずれかを2～3回、イガに十分にかかるように散布する。</p> <p>ベルコートフロアブル 1000倍 ベンレート水和剤◎● 2000～3000倍</p>	<p>●耐性菌を生じやすいので連用しない。</p>
疫病		<ol style="list-style-type: none"> 1. 発生地では草生栽培とする。 2. 密植、樹の軟弱徒長とならないよう栽培管理につとめる。 3. せん孔性害虫を防除する。 	<p>一般に発病部位は地表から1m内外の高さまでの幹、主枝の部分に限られる。</p>
黒色実腐病		<ol style="list-style-type: none"> 1. 胴枯病、実炭疽病に準じた耕種的防除を行う。 2. 密植、肥切れなどにならないように栽培管理につとめる。 3. 草生栽培として下草管理を励行する。 4. 枯死枝、剪定枝は伝染源となるので、園内に放置しない。 	<p>東京都では近年発生が多い。 高温の年に発生しやすい傾向がある。</p>
クリイガ アブラムシ (クリキナコムシ)	6月中旬～下旬	<p>・次の薬剤のいずれかを散布する(イガの内部まで十分散布する)。</p> <p>アドマイヤー水和剤*_a 1000倍 マブリック水和剤20 2000倍</p>	<p>岸根ほか中期晩生種に多くなる傾向がある。 *_a露地栽培については発芽期から開花期を除く</p>
モモノゴ マダラノ メイガ	6月下旬～7月中旬・8月上旬～9月中旬(裂果前)	<p>・次の薬剤のいずれかを散布する。</p> <p>パダンSG水溶性 1500倍 フェニックスフロアブル 4000倍</p>	<p>森早生は7月下旬、8月上旬、中旬、銀寿は8月中旬、下旬、9月上旬それぞれ散布する。</p>

クリ (果樹類、落葉果樹の登録農薬も使用できる)

病害虫名	防除時期	防除方法	参考事項
キクイムシ類	3～5月 (産卵初期)	・ 次の薬剤を地際から150cmまで塗布または散布する。 ガットサイドS (乳) (塗布) 原液～1.5倍 (散布) 1.5倍	卵のふ化始めを中心に樹幹の産卵部位に薬液を噴霧する。
カミキリムシ類	裂果前	1. 被害部を見つけ捕殺する。 2. 次の薬剤を樹幹部に十分に散布する。 トラサイドA乳剤# 100～200倍	# 裂果前 (但し収穫14日前まで) 薬剤が葉にかかるとう薬害を起こすことがあるので注意する。
クリシギゾウムシ	9月下旬～10月 (裂果前)	・ 次の薬剤のいずれかを散布する。 アグロスリン水和剤 1000～3000倍 アディオン乳剤 2000倍	
クリタマバチ	発芽期 (4月中旬) または成虫発生期 (6月中旬～下旬)	1. 耐虫性品種を選ぶ。 2. 低樹高剪定栽培を励行する。 ・ 発生の多い時は、次のいずれかの薬剤を散布する。 1. 芽がゆるみ、先端が白く5mm程度のびた時期 (発芽直前)。 トラサイドA乳剤△ 200倍 2. 成虫の発生初期、一般的には品種「筑波」の雄花満開期 アディオン乳剤# 1000～2000倍 マブリック水和剤20 2000倍	耐虫性品種の中では石鎚、有磨、銀寄、出雲、岸根などは強い。 △トラサイドA乳剤による防除は低樹高剪定栽培でないとう、散布ムラから効果が劣る場合が多い。 # 羽化脱出期に散布 (但し収穫14日前まで)
その他の病害虫		白紋羽病、紫紋羽病、ハマキムシ類、トドマツハダニ、クリフシダニ	