

## プリムラ (花き類・観葉植物の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	灰色かび病	うどんこ病	アブラムシ類	オンシツコナジラミ	キンケクチブトゾウムシ	ハダニ	ナメクジ
トップジンMゾル	1		*c	5	◎						
サンヨール液AL	M1		*b	8		◎	◎			◎	◎
サンヨール	M1		*b	8	◎	◎	◎			◎	
ガゼット粒	1A	劇	*a	1					◎		

\*a:生育期 \*b:開花前まで \*c:発病初期

病害虫名	防除時期	防除方法	参考事項
灰色かび病	生育期	・発生を見たら次の薬剤のいずれかを散布する。 フルピカフロアブル* 2000～3000倍	マラコイデス、オブコニカに発生が多い。 *花き類・観葉植物での登録
オンシツコナジラミ	生育期	・発生を見たら次の薬剤を散布する。 ベストガード水溶剤* 1000倍	*花き類・観葉植物(コナジラミ類)での登録
アブラムシ類		・発生を見たら次の薬剤のいずれかを散布する。 アドマイヤーフロアブル* 2000倍 オルトラン水和剤* 1000～1500倍	*花き類・観葉植物での登録
その他の病害虫		モザイク病、軟腐病、斑点病、苗立枯病	

プリムラ