

樹木・樹木類の病害虫

樹木類(作物群登録)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒害性	使用時期(回数)	炭疽病	立枯病	くも病	白絹病	斑点症(シールドサーコスボラ)	褐斑病	うどんこ病	灰色かび病	ごま色斑点病	輪紋葉枯核菌病	幼果菌核菌病	枝枯菌病	萎凋病	ゆめ進
I Cボルドー66DFL	M1		-	-				◎									
Zボルドー水	M1		*a	-				◎					◎				
ドイツボルドーA水	M1		*a	-				◎									
タチガレン液	32		*d	1		林											
トップジンM水*1㊦	1		*a	5	◎			◎	つ	◎		◎	◎	さ			
トップジンMペースト	1		*b	5													◎
ベンレート水㊦	1		*a	-	◎							◎	◎				
ピリカット乳	39		*a	6					◎								
バシタック水75	7		*a	3		◎	◎										
モンカットFL40	7		*a	3		◎	◎										
フルピカFL	9		*a	5					カ	カ							
マイコシールド水	41		*e	5											◎		
リゾレックス水	14		*a	5		◎	◎										
アンビルFL	3		*a	7	ヤ												
サブロール乳	3		*a	5					◎								
トリフミン水	3		*a	5					し								
パッチコロロン水	3		*g	5					◎								
マネージ乳	3		*a	6					マ								
微量注入用ウッドキングDASH乳	3		-	-												ナ	
バリダシン液	U18		-	3		林											
サンヨール乳	M1		*h	8					シ								
パッチレート塗	M1		*i	-													ア
チウラム80水	M3		*c	-		針											
ペンコゼブ水	M3		*a	4	◎			◎									
			*e	4											◎		
マンゼート水	M3		*a	4	◎			◎									
			*e	4											◎		
ベルクート水	M7		*a	3	◎												
モレストン水	M10		*a	10						コ							
バクテサイド水	25・41・M1		*e	5											◎		
ゲッター水	1・10		*f	5						ハ							
ショウチノスケFL	9・U13		*g	2					◎								

㊦: チオファネートメチル含有剤 ◎: ペノミル含有剤 ㊦を使用した場合には同じ作での◎は使用しないこと。その逆も同様(種子への処理および塗布処理を除く、詳細はP. 856 参照)。

*1: 赤枯病(すぎ)、枝枯病(いぬつげ)、褐斑病(ぼけ)、黒点病(じんちょうげ)、マルゾニナ落葉病(ボブラ)、紫かび病(かし)は樹種別の病害虫と主な農薬の項目に記載 *a: 発病初期 *b: 剪定整枝時、病患部削り取り直後及び病枝切除後 *c: 播種前 *d: 播種覆土直後 *e: 新梢伸長期～発病初期 *f: 感染期～発病初期 *g: 発病前～発病初期 *h: 発生初期 *i: 剪定時及び病患部削り取り直後

針: 針葉樹 林: 林木(苗木)

ア: アジサイ、エゾマツ(苗木)、トドマツ(苗木)、センリョウ、マツを除く
カ: カシを除く コ: コデマリ、ポインセチア、ヤナギを除く シ: ツツジ類を除く ナ: ナラ類を除く
ハ: ハイドランジア、ヤナギを除く マ: マサキ、サルスベリ、ジンチョウゲ、ボブラ、ボケ、ヤナギ、セイヨウキンシバイを除く ヤ: ヤナギ、ボケ、セイヨウキンシバイを除く さ: さくら し: シキミを除く つ: つつじ類

樹木類

樹木類(作物群登録)

薬剤名	作用 機構 分類 コード	人 畜 毒 性	使用 時期 (日 数)	使用 回数	適 用 作 用 部 位	カ イ ガ ラ ム シ	グ ン バ イ ム シ	ス ギ ザ イ ノ タ マ バ エ	シ ヤ ク ト リ ム シ	エ ダ シ ヤ ク	ケ ム シ	オ ビ カ レ	ド ク ガ イ	マ イ マ ガ リ	イ ラ ガ	キ ク イ ム シ	カ シ ノ ナ ガ キ ム シ	ツ ヤ ハ ダ ゴ マ ダ ラ カ ミ キ リ	コ ガ ネ ム シ	ゾ ウ ム シ	ハ ダ ニ	ネ グ サ レ セ ン チ ュ ウ	そ の 他 害 虫
エスマルクDF	11A	*a	-	-					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
サブリーナFL	11A	*a	-	-						◎	◎	◎	◎	◎									
ゼンターリ顆水	11A	*a	-	-							◎	◎	◎	◎									
チューンアップ顆水	11A	*a	-	-							◎												
トアロー水CT	11A	*a	-	つ											◎	◎							
バイオマックスDF	11A	*a	-	-					◎	◎	◎	◎	◎	◎									
バシレックス水	11A	*a	-	-						ト													
ラビサンスプレー	UNM	*k	-	-		◎																	
アタックオイル	UNM	-	-	-		◎																	
ニトルアー ＜アメシロ＞	-	*b	-	-											◎								
オンコル粒5	1A	*s	3	じ	◎																		
オルトラン粒	1B	*t	5	ボ							◎												
オルトラン液	1B	*a	5	ら																幼			
オルトランカプセル	1B	*p	2	あ							◎	◎	◎	◎	◎								
オルトラン水	1B	*a	5																				ア
カルホス乳	1B	劇	*a	6	ま	◎					◎	◎	◎	◎									オ
スミチオン乳	1B		*f	1		◎		◎							◎						フ		
スミバイン乳 ^{a1}	1B	*g									ヤ												
		*d								◎		◎	◎										
		*c						◎								◎	◎		◎				
		*h	6																				ヒ
		*i						タ															
		*j				倒										◎	◎		◎				
		*Q				倒		◎															オ
		*f	1																				
ダイアジノンSLゾル	1B		*o	1																幼			
ダイアジノン水34	1B	劇	*a	4										◎									
ネマキック液	1B		*u	1																			浸
ネマバスター液	1B	劇	*f	1																			イ
アディオソ乳	3A		*a	6	く	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
園芸用キンチョールE	3A		*a	6																注			
ベニカS乳	3A		*a	6	く	◎			◎		◎												
トレボンEW	3A		*a	6	い						◎	◎	◎	◎	◎								
トレボン乳	3A		*e	6	そ				◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
ロビンブッド エアゾル	3A		-	6		◎					◎	◎	◎	◎			◎						
アドマイヤー1粒	4A		*n	2	じ														◎				
アルバリン顆溶	4A		*a	5	ツ						◎	◎	◎	◎	◎								
スタークル顆溶	4A		*a	5	と						◎	◎	◎	◎	◎								
マツグリーン液2	4A		*a	1	ブ						◎	◎	◎	◎	◎								
モスビラン顆溶	4A	劇	*a	5	マ		◎																
ディアナSC	5		*a	2																			
アグリメック乳	6	劇	*f	1	し																		ハ
リバイブ液	6		*L	1	で						樹						樹	樹					浸
キルバー40液*2	8F		*r	1													確						

樹木類 (作物群登録)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(回数)	使用回数	適用目	アブラムシ	カイロムシ	グンバイムシ	スギゾノタマバエ	シヤクトリムシ	エダシヤク	ケムシ	オビカレハ	ドクガ	アメリカシロヒトリ	イラガ	キクイムシ	カシノナガキクイムシ	カミキリ	ツヤハダゴマダラカミキリ	コガネムシ	ゾウムシ	ハダニ	ネグサレセンチュウ	その他の害虫
バロックFL	10B		*a	1																				◎	
バダンSG溶	14	劇	*a	3						◎	◎														
アタブロンSC	15		*a	4								◎	◎	◎	◎	◎									
デミリン水	15		-	3								◎	◎	◎	◎	◎									
アブロードFL	16		-	6	か	幼																			
マトリックFL	18		*a	5								◎	◎	◎	◎	◎									
ロムダンFL	18		*a	5								◎	◎	◎	◎	◎									
トルネードエースDF	22A		*a	4	さ							◎	◎	◎	◎	◎									
ファイントリムDF	22A		*a	4	さ							◎													
ホークアイ顆水	22A		*a	3								◎													
アクセルFL	22B		*a	6	さ							◎	◎	◎	◎	◎									
アセルプリンFL	28		*L	2								◎	◎	◎	◎	◎									
スティンガーFL	28		*a	2								◎	◎	◎	◎	◎									
ヨーバルFL	28		*a	3								◎	◎	◎	◎	◎									
ロックオン水	28		*a	2	ぬ							◎	◎	◎	◎	◎									
サンヨール乳	-		*a	8	じ◎							◎	◎	◎	◎	◎									
サンヨール液AL	-		-	8	る							◎	◎	◎	◎	◎	◎								

*1:空中散布方法による適用害虫については本表には記載していない。

*2:伐倒木、枯損木での登録

*a:発生初期 *b:成虫発生初期から発生後期 *c:成虫発生初期又は直前

*d:若齢・中齢幼虫期 *e:幼虫発生期 *f:移植前 *g:幼虫期

*h:成虫の発生直前～発生最盛期直前(6～7月) *i:虫えい形成期

*j:伐倒、風倒直後樹皮下及び材内生息期 *k:夏期 *L:発生前～発生初期

*m:春季～秋季 *n:植付時 *o:鉢上げ時又は鉢代え時 *p:発生期直前

*Q:樹皮下及び材内生息期 *r:成虫羽化脱出前 *s:生育期 *t:生育期(樹高2m以下) *u:移植前

ア:アザミウマ類 イ:イヌツゲを除く オ:オオハリセンチュウ タ:スギタマバエ

ツ:ツツジ類、ツバキ類を除く ト:トビモンオオエダシヤク ハ:ハマキムシ類

ヒ:ヒノキカワモグリガ フ:フラーバラゾウムシ プ:サクラ、プラタナスを除く

ボ:ツツジ類、トドマツ、ボンセチアを除く マ:マツ、ヤナギ、サクラを除く ヤ:ヤマダカレハ

あ:アカギ、アカマツ、クロマツ、プラタナスを除く い:イヌマキ、ツツジ類を除く

か:アカギを除く く:クチナシを除く さ:サクラを除く し:シキミを除く

じ:ツツジ類を除く そ:ツツジ類、ボインセチア、ソテツを除く

つ:ツバキ類を除く で:サクラ、デイゴ、ホウオウボク、マツ(生立木)を除く

と:ツツジ類、トチノキ、プラタナス、サンゴジュ、ヒイラギモクセイ、イヌマキ、アジサイを除く

ぬ:イヌマキ、サクラを除く ま:マサキ、モッコク、サクラを除く

ら:サクラ、ツツジ類、ツバキ類、クチナシ、マサキ、サンゴジュを除く

る:サルスベリ、マサキ、サザンカ、ツツジ類を除く

若:若～中齢幼虫 樹:樹幹注入 浸:根部浸漬 倒:倒木、伐倒木 注:食入部注入

幼:幼虫 成:成虫 確:薬剤ごとの使用方法を確認すること。