

植木・樹木類の病害虫

樹木類(作物群登録)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(回数)	使用回数	炭疽病	立枯病	くもの巣病	白絹病	斑点症(シニードサーコスボラ)	褐斑病	うどんこ病	灰色かび病	ごま色斑点病	輪紋葉枯病	幼果菌核病	枝枯細菌病	萎凋病	ゆめ進
I Cボルドー66DFL	M1		*g	-					◎									
Zボルドー水	M1		*a	-					◎					◎				
ドイツボルドーA水	M1		*a	-					◎									
タチガレン液	32		*d	1		林												
トップジンM水*1㊦	1		*a	5	◎				◎	つ	◎		◎	◎	さ			
トップジンMペースト	1		*b	5														◎
ベンレート水㊧	1		*a	-	◎								◎	◎				
ピリカット乳	39		*a	6							◎							
パンタック水75	7		*a	3			◎	◎										
モンカットFL40	7		*a	3			◎	◎										
フルビカFL	9		*a	5							カ	カ						
マイコシールド水	41		*e	5												◎		
リゾレックス水	14		*a	5			◎	◎										
アンビルFL	3		*a	7	ヤ													
サブロール乳	3		*a	5						◎								
トリフミン水	3		*a	5							し							
パッチコロソ水	3		*g	5						◎								
マネージ乳	3		*a	6						マ								
微量注入用ウッドキングDASH乳	3		-	-													ナ	
バリダシン液	U18		-	3		林												
サンヨール乳	M1		*h	8							シ							
パッチレート塗	M1		*i	-														ア
チウラム80水	M3		*c	-		針												
ペンコゼブ水	M3		*a	4	◎			◎								◎		
マンゼート水	M3		*a	4	◎			◎								◎		
ベルコート水	M7		*a	3	◎													
モレスタン水	M10		*a	10							コ							
バクテサイド水	25・41・M1		*e	5												◎		
ゲッター水	1・10		*f	5								ハ						
ショウチノスケFL	9・U13		*g	2						◎								

㊦: チオファネートメチル含有剤 ㊧: ペノミル含有剤 ㊦を使用した場合には同じ作での㊧は使用しないこと。その逆も同様(種子への処理および塗布処理を除く)。

*1:赤枯病(すぎ)、枝枯病(いぬつけ)、褐斑病(ぼけ)、黒点病(じんちょうげ)、マルゾニナ落葉病(ボブラ)、紫かび病(かし)は樹種別の病害虫と主な農薬の項目に記載 *a:発病初期 *b:剪定整枝時、病患部削り取り直後及び病枝切除後 *c:播種前 *d:播種覆土直後 *e:新梢伸長期～発病初期 *f:感染期～発生初期 *g:発病前～発病初期 *h:発生初期 *i:剪定時及び病患部削り取り直後
 針:針葉樹 林:林木(苗木)
 ア:アジサイ、エゾマツ(苗木)、トドマツ(苗木)、センリョウ、マツを除く
 カ:カシを除く コ:コデマリ、ポインセチア、ヤナギを除く シ:ツツジ類を除く ナ:ナラ類を除く
 ハ:ハイドランジア、ヤナギを除く マ:マサキ、サルスベリ、ジンチョウゲ、ボブラ、ボケ、ヤナギ、セイヨウキンシバイを除く ヤ:ヤナギ、ボケ、セイヨウキンシバイを除く さ:さくら し:シキミを除く つ:つつじ類

樹木類

樹木類 (作物群登録)

薬剤名	作用機 構分類 コード	人畜 毒害 性	使用 時期 (回数)	使用 回数	適 用 目 的	ア ブ ラ ム シ 類	カ イ ガ ラ ム シ 類	グ ン バ イ ム シ 類	ス ギ ザ イ ノ タ マ バ エ 類	シ ヤ ク ト リ ム シ 類	エ ダ ク シ ヤ ク 類	ケ ム シ 類	オ ビ カ レ 類	ド ク ガ イ 類	マ マ イ ガ リ 類	イ ラ ガ 類	キ ク イ ム シ 類	カ シ ノ ナ ガ キ ク イ ム シ 類	ツ ヤ ハ ダ ゴ マ ダ ラ カ ミ キ リ 類	コ ガ ネ ム シ 類	ソ ウ ム シ 類	ハ ダ ダ ニ 類	ネ グ サ レ セ ン チ ユ ウ 類	そ の 他 害 虫		
エスマルクDF	11A	*a	-	-						◎	◎	◎	◎	◎	◎											
サブリナFL	11A	*a	-	-										◎	◎	◎										
ゼンターリ顆水	11A	*a	-	-									◎	◎	◎	◎										
チューンアップ顆水	11A	*a	-	-									◎													
トアロー水CT	11A	*a	-	つ												◎	◎									
バイオマックスDF	11A	*a	-	-						◎	◎	◎	◎	◎	◎											
バシレックス水	11A	*a	-	-						ト																
ラビサンスプレー	UNM	*k	-	-		◎																				
アタックオイル	UNM	-	-	-		◎																				
ニトルアー <アメシロ>	-	*b	-	-											◎											
オンコル粒5	1A	*s	3	じ	◎																					
オルトラン粒	1B	*t	5	ポ							◎															
オルトラン液	1B	*a	5	ら																	幼					
オルトランカプセル	1B	*p	2	あ							◎	◎	◎	◎	◎											
オルトラン水	1B	*a	5	ま																				ア		
カルホス乳	1B	*a	6	ま		◎					◎	◎	◎	◎	◎									オ		
スミチオン乳	1B	*f	1	6		◎	◎								◎									フ		
スミパイン乳*1	1B	*g	6								◎			ヤ												
		*d					◎			◎																
		*c																					◎			
		*h																								ヒ
		*i								タ																
		*j																								
*k																										
*l																										
*m																										
*n																										
*o																										
*p																										
*q																										
*r																										
ダイアジノンSLゾル	1B	*o	1																			幼				
ダイアジノン水34	1B	*a	4												◎											
ネマキック液	1B	*u	1																					浸		
ネマバスター液	1B	*f	1																					イ		
アデオ乳	3A	*a	6	く	◎					◎	◎	◎	◎	◎	◎											
園芸用キンチョールE	3A	*a	6																							
ベニカS乳	3A	*a	6	く	◎					◎																
トレボンEW	3A	*a	6	い							◎			◎	◎	◎	◎									
トレボン乳	3A	*e	6	そ						◎	◎	◎	◎	◎	◎											
ロビンフッド エアゾル	3A	-	6		◎									◎	◎	◎	◎					◎				
アドマイヤー1粒	4A	*n	2	じ																		◎				
アルバリン顆溶	4A	*a	5	ツ										◎	◎	◎	◎									
スタークル顆溶	4A	*a	5	と										◎	◎	◎	◎									
マツグリーン液2	4A	*m	1	プ		◎	◎							◎	◎	◎	◎									
モスピラン顆溶	4A	*a	5	マ																						
ディアナSC	5	*a	2																					ハ		
アグリメック乳	6	*f	1	し																				浸		
リバイブ液	6	*l	1	で									樹						樹	樹						
キルパー40液*2	8F	*r	1																					確		

樹木類(作物群登録)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒害性	使用時期(回数)	適用回数	アブラムシ	カイガラムシ	グンバイムシ	スギザイノタマバエ	シヤクトリムシ	エダシヤク	ケムシ	オビカレ	ドクガイ	トドマツ	アメリカシロヒトリ	イラガ	キクイムシ	カミノナガキクイムシ	ツヤハダゴマダラカミキリ	コガネムシ	ソウムシ	ハダシ	ネグサレセンチュウ	その他害虫
バロックFL	10B		*a 1																				◎	
バダシG溶	14	劇	*a 3					◎	○															
アタブロンSC	15		*a 4							◎	○	○	○	○										
デミリン水	15		- 3							若	若	若	若	若										
アブロードFL	16		- 6	か	幼																			
マトリックFL	18		*a 5							◎	○	○	○	○										
ロムダンFL	18		*a 5							◎	○	○	○	○										
トルネードエースDF	22A		*a 4	さ						◎	○	○	○	○										
ファイントリムDF	22A		*a 4	さ						◎														
ホークアイ顆水	22A		*a 3							◎														
アクセルFL	22B		*a 6	さ						◎	○	○	○	○										
アセルプリンFL	28		*L 2							◎	○	○	○	○										
ステインガーFL	28		*a 2							◎	○	○	○	○										
ヨーバルFL	28		*a 3							◎	○	○	○	○										
ロックオン水	28		*a 2	ぬ						◎	○	○	○	○										
サンヨール乳	-		*a 8	じ	◎																			
サンヨール液AL	-		- 8	る						◎	○	○	○	○	◎									

*1:空中散布方法による適用害虫については本表には記載していない。
 *2:伐倒木、枯損木での登録
 *a:発生初期 *b:成虫発生初期から発生後期 *c:成虫発生初期又は直前
 *d:若齢・中齢幼虫期 *e:幼虫発生期 *f:移植前 *g:幼虫期
 *h:成虫の発生直前～発生最盛期直前(6～7月) *i:虫えい形成期
 *j:伐倒、風倒直後樹皮下及び材内生息期 *k:夏期 *L:発生前～発生初期
 *m:春季～秋季 *n:植付時 *o:鉢上げ時又は鉢代え時 *p:発生期直前
 *Q:樹皮下及び材内生息期 *r:成虫羽化脱出前 *s:生育期 *t:生育期(樹高2m以下) *u:移植前

ア:アザミウマ類 イ:イヌツグを除く オ:オオハリセンチュウ タ:スギタマバエ
 ツ:ツツジ類、ツバキ類を除く ト:トビモンオオエダシヤク ハ:ハマキムシ類
 ヒ:ヒノキカワモグリガ フ:フラーバラゾウムシ プ:サクラ、プラタナスを除く
 ボ:ツツジ類、トドマツ、ボンセチアを除く マ:マツ、ヤナギ、サクラを除く ヤ:ヤマダカレハ
 あ:アカギ、アカマツ、クロマツ、プラタナスを除く い:イヌマキ、ツツジ類を除く
 か:アカギを除く く:クチナシを除く さ:サクラを除く し:シキミを除く
 じ:ツツジ類を除く そ:ツツジ類、ポインセチア、ソテツを除く
 つ:ツバキ類を除く て:サクラ、デイゴ、ホウオウボク、マツ(生立木)を除く
 と:ツツジ類、トチノキ、プラタナス、サンゴジュ、ヒイラギモクセイ、イヌマキ、アジサイを除く
 ぬ:イヌマキ、サクラを除く ま:マサキ、モッコク、サクラを除く
 ら:サクラ、ツツジ類、ツバキ類、クチナシ、マサキ、サンゴジュを除く
 る:サルスバリ、マサキ、サザンカ、ツツジ類を除く
 若:若～中齢幼虫 樹:樹幹注入 浸:根部浸漬 倒:倒木、伐倒木 注:食入部注入
 幼:幼虫 成:成虫 確:薬剤ごとの使用方法を確認すること。