

ツツジ類*1 (作物群登録)(樹木類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒害性	使用時期(日数)	使用回数	褐斑病	もみぢ病	うどんこ病	アブラムシ類	カイガラムシ類	ロウムシ類	ツツジグンバイ類	ケムシ類	シャクトリムシ類	イラガ類	コガネムシ類	イシユクセンチュウ	その他害虫
Ｚボルドー水	M1		－	－		◎											
クプロシールドFL	M1		－	－	◎												
トップジンM水㊦	1		*i	5	◎		◎										
バシタック水75	7		*i	8		◎											
ダコニール1000FL	M5		－	6	◎												
サンヨール乳	M1		*a	8			◎	◎			◎						ツ
チューリサイド水	11A		*a	－													ベ
オンコル粒 5	1A		*d *c	1 3				◎								幼 幼	
ガゼット粒	1A	劇	*c *f	1 2							◎					◎	
オルトラン粒	1B		*a *m	5							◎		◎				
オルトラン液	1B		*a	5							◎					幼	ベ
オルトラン水	1B		*a	5							◎						
ジェイエース溶	1B		*a	5							◎						
ジェイエース粒	1B		*a	5							◎						
スミチオン乳	1B		－	6							グ						ハ
ダイアジノンSLゾル	1B		*e	1												幼	
ネマトリンエース粒	1B		*g	1												◎	
アディオンFL	3A		－	6							◎						
スカウトFL	3A	劇	－	5							◎						
トレボン乳	3A		*h －	6							◎		◎	◎			オ
トレボンEW	3A		*a	6							◎	◎					
フォース粒	3A	劇	*e	1												幼	
アクタラ顆溶	4A		*a	5							◎						
アクタラ粒 5	4A		*c *e	1 1							◎ ◎					幼 幼	
アドマイヤー 1 粒	4A		*k *a	2 5							◎ ◎					◎	
アドマイヤーFL	4A	劇	*L *b	5 2							◎ 灌						
アルバリン顆溶	4A		*a	5							◎	◎					
スタークル顆溶	4A		*a	5							◎						
スタークル粒	4A		*a	5							◎						
ダントツ溶	4A		*a	6							◎						
マツグリーン液 2	4A		*a	5				◎	◎		◎	◎					チ
モスピラン粒	4A		*a	1							◎						
トランスフォームFL	4C		*a	3							◎						
サンヨール液AL	－		－	8							◎	◎		◎			ツ
カダンKエアゾル	3A・UNM・NC		*j	－					◎	◎							

㊦：チオファネートメチル含有剤 ◎：ベノミル含有剤 ㊦を使用した場合には同じ作での◎は使用しないこと。その逆も同様（種子への処理および塗布処理を除く、詳細はP.856 参照）。

*1: ツツジ類…アザレア、おおむらさき、くるめつつじ、さつき、しゃくなげ を含む

【どうだんつつじは含まない】

*a:発生初期 *b:発生前 *c:生育期 *d:定植時 *e:植付時 *f:定植時及び生育期 *g:定植前

*h:幼虫発生期 *i:発病初期 *j:夏期、冬期 *k:植付又は植替時

*L:発生初期（但し露地栽培については発芽期から開花期を除く） *m:生育期（樹高2m以下）

オ:オビカラハ グ:グンバイムシ類 チ:チュウレンジハバチ ツ:ツツジコナジラミ

ハ:ハマキムシ類 ベ:ベニモンアオリンガ 幼:幼虫 灌:株元灌注