

## ハイドラント、フェニックス、ブアルディア

(樹木類の登録農薬も使用できる)

### ハイドラント (アジサイ)

病害虫名	防除時期	防除方法	参考事項
輪斑病	生育期	・発生を見たら次の薬剤を散布する。 ゲッター水和剤㊦● 1000倍	●耐性菌を生じやすいので連用しない。
灰色かび病	感染期～発生初期	・発生を見たら次の薬剤を散布する。 ゲッター水和剤㊦● 1000倍	●耐性菌を生じやすいので連用しない。
葉腐病	生育期	・発生を見たら次の薬剤を散布する。 リゾレックス水和剤 500～1000倍	
—	剪定時等	・剪定時及び病患部削り取り直後に次の薬剤を切口等に塗布する。 バッチレート塗 原液	バッチレートは作物名アジサイで登録。

### フェニックス・ロベニー (ヤシ類の登録農薬も使用できる)

病害虫名	防除時期	防除方法	参考事項
炭疽病		・次の薬剤を散布する。 トップジンM水和剤㊦●* 1000～2000倍	●耐性菌を生じやすいので連用しない。 *樹木類での登録
トビモンオオエダシヤク	発生初期	・次の薬剤を散布する。 バシレックス水和剤 500～1000倍	
その他の病害虫		褐紋病、黒葉枯病、カイガラムシ類	

### ブアルディア

病害虫名	防除時期	防除方法	参考事項
立枯性病害	植付前	・圃場の排水に留意し、密植を避ける。 ・土壌消毒を行う (土壌消毒の項参照)。	ピシウム菌、リゾクトニア菌のいづれによっても発生する。
灰色かび病		・施設内の過湿に留意し、発病茎・花はただちに除去する。	
アザミウマ類	生育期	・発生初期に次の薬剤を散布する。 オルトラン水和剤* 1000倍	*樹木類での登録
アブラムシ類	生育期	・発生初期に次の薬剤を散布する。 スミチオン乳剤* 1000倍	*樹木類での登録
カイガラムシ類	生育期	・発生初期に次の薬剤を散布する。 カルホス乳剤* 1000倍	*樹木類での登録
ハダニ類	生育期	・発生初期に次の薬剤を散布する。 バロックフロアブル* 2000倍	*樹木類での登録
その他の病害虫		モザイク病、暗斑病、コナジラミ類、チャノホコリダニ、葉枯線虫病 (イチゴセンチュウ)、ネコブセンチュウ類	