

チャ

薬剤名	作用機 構分類 コード	人 畜 毒 性	使 用 時 期 (日 数)	使 用 回 数	赤 焼 病	網 も ち 病	白 星 病	新 梢 枯 死 症	炭 疽 病	も ち 病	輪 斑 病	灰 色 か び 病	黒 葉 腐 病	白 紋 羽 病	褐 色 円 星 病
I Cボルドー66DFL	M1		*a	-	◎				◎						
Zボルドー水	M1		7	-	◎	◎			◎	◎					
クプロシールドFL	M1		1	-	◎	◎			◎	◎					
コサイド3000DF	M1		14	-	◎	◎		輪	◎	◎					◎
サンボルドー水	M1		21	-	◎				◎	◎					
ドイツボルドーA水	M1		14	-	◎	◎			◎	◎					
スターナ水	31		7	2	◎										
トップジンM水㊟	1		7	1			◎		◎		◎		◎		◎
ベンレート水㊿	1		14	1			◎		◎		◎				◎
			-	1										根	
アミスター20FL	11		14	3				輪	◎	◎	◎				
スクレアFL	11		3	3		◎		◎	◎	◎	◎				
ストロビーFL	11		10	3		◎		◎	◎	◎	◎				
プリントFL25	11		14	2				◎	◎	◎	◎				◎
フロンサイドSC	29		14	1		◎		輪	◎	◎	◎	◎			◎
ロブラール水	2		21	2								◎			
インダーFL	3		7	2		◎			◎	◎					◎
オンリーワンFL	3		7	2		◎		◎	◎	◎					◎
スコア顆水	3		7	2		◎			◎	◎					◎
トリフミン水	3		14	3					◎	◎					
ラリー水	3		14	2		◎			◎	◎					
テプロスFL	U16		14	2				◎	◎		◎				
ダコニール1000FL	M5		10	1		◎		輪	◎	◎	◎	◎	◎		◎
ベルコートFL	M7		7	2				◎	◎		◎				
スパットサイド水	M11		7	2					◎	◎	◎				
ニマイパー水㊿	1・10		14	1				◎	◎	◎	◎				◎
ナリアWDG	7・11		7	2		◎		◎	◎	◎	◎		◎		◎
カスミンボルドー水	24・M1		14	2	◎			輪	◎		◎				◎

㊟：チオファネートメチル含有剤 ㊿：ベノミル含有剤 ㊿を使用した場合には同じ作
での㊿は使用しないこと、その逆も同様（種子への処理および塗布処理を除く）。

*a:最終摘採後

輪:新梢枯死症(輪斑病菌による) 根:苗木根部24時間浸漬

チャ

薬剤名	作用機 構分類 コード	人畜 毒害 性	使用 時期 (日数)	使 用 回 数	コ ミ カ ン ア ブ ラ ム シ	チ ヤ ノ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ	カ イ ガ ラ ム シ 類	ツ ノ ロ ウ ム シ	ツ ワ シ ロ カ イ ガ ラ ム シ	ツ マ グ ロ ア オ カ ス ミ カ メ	チ ヤ ト ゲ コ ナ ジ ラ ミ	ハ ス モ ン ヨ ト ウ	チ ヤ ハ マ キ	チ ヤ ノ コ カ ク モ ン ハ マ キ	チ ヤ ノ ホ ソ ガ ク	ヨ モ ギ エ ダ シ ヤ ク	ナ ガ チ ヤ コ ガ ネ	マ ダ ラ カ サ ハ ラ ハ ム シ	チ ヤ ノ ミ ド リ ヒ メ ヨ コ バ イ	ハ ダ ニ 類	チ ヤ ノ ナ ガ サ ビ ダ ニ	チ ヤ ノ ホ コ リ ダ ニ	
除虫菊乳3	3A		10	3												◎	シ						
スピノエースFL	5		7	2		◎							◎	◎	◎	◎		◎					
アグリメック乳	6	劇	7	1		◎				◎				◎	◎				◎	カ	◎	◎	
ミルベノック乳	6		7	1	◎					◎					◎					カ	◎	◎	
エスマルクDF	11A	*k	-	-								◎	◎	◎	◎								
チューンアップ顆水	11A	*i	-	-									◎	◎	◎	◎							
デルフィン顆水	11A	*i	-	-									◎	◎		◎							
トアロー水CT	11A	*k	-	-											◎	◎							
バシレックス水	11A	*k	-	-								◎	◎	◎	◎	シ							
ハマキ天敵水	31	*i	-	-									◎	◎									
石灰硫黄合剤	UN	*o	-	-																	◎	サ	
スプレーオイル乳	UNM	*a	-	-				◎													◎		
		*c	-	-			◎		◎												◎		
ハーベストオイル乳	UNM	*e	-	-				◎		◎												カ	
		*m	-	-																			
ラビサンスプレー乳	UNM	*e	-	-				◎		◎											◎		
サンクリスタル乳	-		1	-												◎					カ	◎	
ハマキコン-N	-	*h	-	-									◎	◎									
オリオン水40	1A	劇	14	3											◎								
エルサン乳	1B	劇	*n	2				◎				◎		コ									
エンセダン乳	1B	*f	1		◎								◎	◎	◎	◎			◎	カ		◎	
オルトラン水	1B		45	1	◎									◎					◎				
カルホス乳	1B	劇	21	1				◎						コ	◎	◎							◎
ショットガン乳	1B	劇	*b	1				◎															
スミチオン乳70	1B		21	1						◎					コ				成				
			90	1															幼				
キラップFL	2B		7	1	◎				◎							◎							
MR. ジョーカー水	3A		21	2	◎								◎	◎	◎	◎			◎				
アディオソ乳	3A		14	1	◎									◎	◎				◎				
アーデント水	3A		14	3	◎										◎	◎			◎	カ			
アーデントFL	3A		14	3	◎										◎	◎			◎	カ			

チ
ヤ

チャ

薬剤名	作用機 構分類 コード	人畜 毒 性	使用 時期 (日 数)	使 用 回 数	コ ミ カ ン ア ブ ラ ム シ	チ ヤ ノ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ	カ イ ガ ラ ウ ム シ	ツ ノ ロ ウ シ	ク ワ シ ロ カ イ ガ ラ ム シ	ツ マ グ ロ ア オ カ ス ミ カ メ	チ ヤ ト ゲ コ ナ ジ ラ ミ	ハ ス モ ン ヨ ト ウ	チ ヤ ノ コ カ ク モ ン ハ マ キ	チ ヤ ノ コ カ ク モ ン ハ マ キ	チ ヤ ノ コ カ ク モ ン ハ マ キ	ヨ モ ギ エ ダ シ ヤ ク	ナ ガ ラ カ サ ハ ラ ハ ム シ	マ ダ ラ カ サ ハ ラ ハ ム シ	チ ヤ ノ ミ ド リ ヒ メ ヨ コ バ イ	ハ ダ ニ	チ ヤ ノ ナ ガ サ ビ ダ ニ	チ ヤ ノ ホ コ リ ダ ニ	
スカウトFL	3A	劇	7	3												◎				◎			
テルスター水	3A		14	2		◎								◎	◎	◎	◎			◎	カ		
トレボン乳	3A		21	2		◎										◎				◎			
マブリック水20	3A	劇	21	2	◎	◎				◎					◎	◎	◎			◎	カ		
ロディー乳	3A	劇	7	1		◎				◎	◎			◎	◎	◎				◎			
アクタラ顆溶	4A		7	1	◎	◎				◎										◎			
アドマイヤー顆水	4A	劇	7	1		◎				◎						◎				◎			
アルバリン顆溶 スタークル顆溶	4A		7	2	◎	◎				◎						◎				◎			
ダントツ溶	4A		7	1	◎	◎				◎	◎					◎			◎	◎			
バリアード顆水	4A	劇	7	1	◎	◎									◎			◎	◎				
ベストガード溶	4A		7	2		◎														◎			
モスビラン顆水	4A	劇	7	1		◎										◎				◎			
ディアナSC	5		1	1		◎					◎			◎	◎	◎	◎						
アフーム乳	6		7	1		◎						◎		◎	◎	◎	◎						◎
コルト顆水	9B		7	2	ア	◎			◎	◎	◎									◎			
バロックFL	10B		14	1																	カ		
オマイト乳	12C		14	2																	カ	◎	
コテツFL	13	劇	7	2		◎					◎				◎		シ	◎	◎	カ	◎	◎	
パダンSG溶	14	劇	10	1		◎										◎				◎			
アタブロン乳	15		14	2										◎	◎		◎						
カスケード乳	15		7	2		◎				◎	◎			◎	◎	◎	◎			◎		◎	◎
ノーモルト乳	15		7	1												◎	◎						
マッチ乳	15		7	1		◎								◎	◎	◎	◎						
アブロード水	16		14	2					若		◎										幼		
ファルコンFL	18		7	2							◎			◎	◎	◎	◎						
マトリックFL	18		7	2										◎	◎	◎	◎						
ロムダンFL	18		14	2										◎	◎	◎	◎						
カネマイトFL	20B		7	1																	カ		
マイトコーネFL	20D		*j	1																	カ	◎	
サンマイトFL	21A	劇	14	2		◎														◎	カ	◎	◎

チャ

病害虫名	防除時期	防除方法	参考事項
炭疽病、 もち病、 網もち病	5～7月 9～10月	・次の薬剤のいずれかを散布する。 オンリーワンフロアブル#1 2000～3000倍 スコア顆粒水和剤 2000倍 ダコニール1000#2 1000倍 Zボルドー(水)#3 400～500倍 ストロビーフロアブル#4 2000倍 フロンサイドSC 2000倍	炭疽病は、雨の多い年や日照の少ない樹陰地の茶に発生が多い。 #1 網もち病 2000倍 #2 炭疽病、もち病 700～1000倍 #3 炭疽病 400倍 #4 炭疽病 2000～3000倍
ツマグロ アオカス ミカメ	5月上旬～ 7月下旬	・次の薬剤のいずれかを散布する。 ロディー乳剤 1000倍 アクタラ顆粒水溶剤 3000倍	防除は萌芽期から一葉期までに行う。
チャドク ガ(チャケ ムシ)	5～11月	1. 若齢幼虫期に捕殺する。 2. 最終摘採後から冬期までに散布する。 エルサン乳剤 1000倍	チャドクガの幼虫は、5～6月及び7～8月に発生する。
チャハマ キ、チャ ノコカク モンハマ キ	4月下旬～ 5月上旬 (一番茶前) 6月中旬～ 7月上旬 (二番茶前) 7月下旬～ 8月中旬 (二番茶後) 9月上旬～ 10月中旬	1. 成虫密度を下げたからハマキコン-Nを150～250本/10a処理すると効果がある。 2. 次の薬剤のいずれかを散布する。 エスマルクDF 1000倍 カスケード乳剤 4000倍 グレーシア乳剤 2000倍 コテツフロアブル# 2000倍 スピノエースフロアブル チャハマキ 4000倍 チャノコカクモンハマキ 2000～4000倍 フェニックスフロアブル 2000倍 ヨーバルフロアブル 2500～5000倍	二番茶葉に被害が多い。 幼虫が葉裏の表皮下に潜入している時期に防除する。 #チャノコカクモンハマキのみに登録
チャノホ ソガ(チャ ノサンカ クハマキ)	4月上旬～ 下旬 5月下旬～ 6月中旬 7月上旬～ 下旬 8月上旬～ 下旬 9月中旬～ 10月上旬	・次の薬剤のいずれかを散布する。 カスケード乳剤 4000倍 ミルベノック乳剤 1000倍 ダントツ水溶剤 2000～4000倍 アドマイヤー顆粒水和剤 5000～10000倍 ヨーバルフロアブル 2500～5000倍	

チヤ

病害虫名	防除時期	防除方法	参考事項
チャノミ ドリヒメ ヨコバイ	6月上旬～ 10月上旬	・次の薬剤のいずれかを散布する。 アクトラ顆粒水溶剤 2000～3000倍 アディオン乳剤 2000～3000倍 コテツフロアブル 2000倍 ヨーバルフロアブル 2500倍	二、三番茶期の芽に被害が多い。
ナガチャ コガネ幼虫	10月中旬～ 11月中旬	・被害発生部にスミチオン乳剤 70を土壌灌注する(2000～4000倍、1㎡あたり5L)。	6～7月に出現した成虫は、土中に産卵。幼虫が根を食い翌年の一番茶が減収する。
クワシロ カイガラ ムシ	5月中旬～ 下旬 7月中旬～ 下旬 秋冬期 (10～3月)	・次の薬剤のいずれかを散布する。 コルト顆粒水和剤 2000～3000倍 アブロードエースフロアブル #1 1000倍 ・ハーベストオイル 50～100倍	幼虫ふ化期に防除する。ふ化後の幼虫は小さく見つけにくい。5月中旬頃カイガラをはがして卵～幼虫がこぼれてくる状態から孵化最盛期となる。 #1 カイガラムシ類での登録
カンザワ ハダニ	秋冬期～春 期発芽前又 は摘採直後 3月中旬～ 下旬(萌芽 前) 5月下旬～ 6月中旬 (一番茶摘 採直後) 8月上旬～ 11月上旬	・ハーベストオイル 50～150倍 ・次の薬剤のいずれかを散布する。 カネマイトフロアブル 1000倍 ダニオーテフロアブル 2000倍 ダニゲッターフロアブル 2000倍 ダニサラバフロアブル 1000～2000倍 マイトコーネフロアブル 1000倍 ミルベノック乳剤 1000倍 バロックフロアブル 1000～3000倍	かぶせ茶園では必ず防除を行う。晩霜害のあった場合は多発しやすいため、殺ダニ剤による防除を励行する。殺ダニ剤は、みる芽(新芽)につくと葉害が生ずることがある。
チャノナ ガサビダ ニ	4～6月 9～11月	・次の薬剤のいずれかを散布する。 サンマイトフロアブル 1000～2000倍 ミルベノック乳剤 1000倍	一番茶摘採後に発生が多い。