

## 6. 作物別使用指針

### (1) 移植水稻

#### ① 除草剤の種類と適用草種一覧

| 処 理         |                                                | 雑<br>草<br>名<br><br>除草剤名 | 一年生              | 多年生              |                  |                       |                  |                            |                  | 浮遊生                   |                  |                            |                       |        |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|
| 時期          | 方法                                             |                         | ノ<br>ビ<br>エ<br>他 | マ<br>ツ<br>バ<br>イ | ホ<br>タ<br>モ<br>イ | ヘ<br>ラ<br>オ<br>モ<br>カ | ウ<br>リ<br>カ<br>ワ | ミ<br>ズ<br>ガ<br>ヤ<br>ツ<br>カ | オ<br>モ<br>ダ<br>カ | ヒ<br>ク<br>ル<br>シ<br>ロ | セ<br>グ<br>ワ<br>リ | コ<br>ウ<br>キ<br>ヤ<br>ガ<br>ラ | ウ<br>キ<br>ク<br>サ<br>類 | 藻<br>類 |
|             |                                                |                         |                  |                  |                  |                       |                  |                            |                  |                       |                  |                            |                       |        |
| 初<br>中<br>期 | 土<br>壌<br>処<br>理<br>(湛<br>水<br>散<br>布)         | アッパレZジャンボ粒              | ○ ○              | ○ ○ ○            | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      | ○ ○ ○                 | ○ ※3   |
|             |                                                | イノーバDXアップ1<br>キロ粒51     | ○ ○              | ○ ○              |                  |                       | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            |                            |                       | ○ ※3   |
|             |                                                | ウィードコア1キロ粒              | ○ ○              | ○ ○ ○            | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      | ○ ○ ○                 | ○ ※3   |
|             |                                                | ウィードレス粒17               | ○ ○              | ○ ○              | ○ ○              |                       | ○ ○              |                            | ○ ○              |                       | ○ ○              |                            |                       | ○ ※3   |
|             |                                                | エーワンジャンボ粒               | ○ ○              | ○ ○              | ○ ○              |                       | ○ ○ ○            |                            | ○ ○ ○            |                       | ○ ○ ○            |                            |                       |        |
|             |                                                | エンペラージャンボ粒              | ○ ○              | ○ ○ ○            | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      | ○ ○ ○                 | ○ ※3   |
|             |                                                | エンペラー豆つぶ250<br>粒        | ○ ○              | ○ ○ ○            | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      | ○ ○ ○                 | ○ ※3   |
|             |                                                | ジェイフレンドジャンボ<br>粒        | ○ ○              | ○ ○ ○            | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      | ○ ○ ○                 |        |
|             |                                                | 先陣ジャンボ粒                 | ○ ○              | ○ ○ ○            | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      | ○ ○ ○                 | ○ ※3   |
|             |                                                | トップガンR1キロ粒              | ○ ○              | ○ ○ ○            | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      | ○ ○ ○                 | ○ ※3   |
|             |                                                | トップガンRジャンボ<br>粒         | ○ ○              | ○ ○ ○            | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      | ○ ○ ○                 | ○ ※3   |
|             |                                                | バッチリLX1キロ粒              | ○ ○              | ○ ○ ○            | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      | ○ ○ ○                 | ○ ※3   |
|             |                                                | バッチリLXジャンボ<br>粒         | ○ ○              | ○ ○ ○            | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      | ○ ○ ○                 | ○ ※3   |
|             |                                                | フジグラス粒17                | ○ ○              | ○ ○              | ○ ○              |                       | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      | ○ ○ ○                 | ○ ※3   |
| 中期          | ご<br>く<br>浅<br>い<br>湛<br>水<br>散<br>布<br>又<br>は | バサグラン粒                  | ○ ※2             | ○ ○ ○            | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      |                       |        |
| 中<br>後<br>期 |                                                | クリンチャーバスME<br>液         | ○ ○              | ○ ○ ○            | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      |                       |        |
|             |                                                | ワイドアタックSCFL             | ○ ○              | ○ ○ ○            | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                 | ○ ○ ○            | ○ ○ ○                      |                       |        |
| 後<br>期      | 金<br>葉<br>散<br>布                               | 落水散布                    | 2,4-Dアミン塩液 ※1    | ○ ※2             |                  |                       |                  |                            |                  |                       |                  |                            |                       |        |
|             |                                                | MCPソーダ塩液 ※1             | ○ ※2             | ○ ○              | ○ ○              | ○ ○                   | ○ ○              | ○ ○                        | ○ ○              | ○ ○                   | ○ ○              | ○ ○                        |                       |        |
|             | 湛<br>水<br>散<br>布                               | モゲトン粒                   |                  |                  |                  |                       | ○                |                            | ○                |                       | ○ ○              | ○ ○                        |                       |        |

※1 水稻として登録 ※2 イネ科を除く ※3 藻類による表層はく離防止

②使用指針(対象雑草：水田一年生雑草)

| 除草剤名                | 使用時期                                                        | 使用量/10a            | ノビエ殺草<br>限界葉期      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| アップレZジャンボ粒          | 移植後3～30日まで                                                  | 40g×10個            | 3                  |
| イノーバDXアップ1<br>キロ粒51 | 移植直後～30日                                                    | 1 kg               | 2.5                |
| ウィードコア1キロ粒*1        | 移植後7日～収穫60<br>日前まで                                          | 1 kg               | 4                  |
| ウィードレス粒17           | 移植後5～30日まで                                                  | 3 kg               | 2.5                |
| エーワンジャンボ粒           | 移植後5～30日まで                                                  | 30 g×10個           | 砂壤土 2.5<br>壤土～埴土 3 |
| エンペラー豆つぶ250粒*1      | 移植直後～移植後30<br>日まで                                           | 25 g×10個           | 3                  |
| エンペラージャンボ粒*1        |                                                             | 250 g              | 3                  |
| クリンチャーバスME<br>液*1   | 移植後15日～収穫50<br>日前まで                                         | 1000mL             | 5                  |
| ジェイフレンドジャン<br>ボ粒    | 移植後5日～移植後30<br>日まで                                          | 40 g×10個           | 3                  |
| 先陣ジャンボ粒             | 植代後～移植7日前<br>又は移植直後～移植<br>後30日まで                            | 20 g×10個           | 1                  |
| トップガンR1キロ粒          | 移植時、移植直後～<br>移植後30日まで                                       | 1 kg               | 3                  |
| トップガンRジャンボ<br>粒     | 移植直後～移植後30<br>日まで                                           | 25 g×10個           | 2.5                |
| バサグラン粒*2            | 移植後15～収穫45日<br>前                                            | 3～4kg              | －                  |
| バッチリLXジャンボ<br>粒     | 移植直後～移植後30<br>日まで                                           | 40 g×10個           | 2.5                |
| バッチリLX1キロ粒          |                                                             | 1 kg               | 2.5                |
| フジグラス粒17            | 移植後5～30日まで                                                  | 3 kg               | 2.5                |
| ワイドアタックSCFL*1       | 移植後20日(イネ5葉<br>期以後)～収穫30日前<br>まで                            | 100mL              | 6                  |
| 2,4-Dアミン塩液*3        | ①有効分げつ終止期<br>～幼穂形成期前(収<br>穫60日前まで)<br>②幼穂形成始期(収穫<br>60日前まで) | ①80～120 g<br>②60 g | －                  |
| MCPソーダ塩液*2          | 有効分げつ終止期～<br>幼穂形成期前(収穫60<br>日前まで)                           | 160～240 g          | －                  |

\*多年生雑草については、各除草剤の使用基準を確認してから使用してください。

\*1：「一年生雑草」で登録 \*2：「一年生雑草（イネ科を除く）」で登録

\*3：「水田雑草（イネ科を除く）」で登録

注意：湛水条件で農薬を施用する場合には、規定の止水期間（1週間程度）を遵守し、用水の掛け流しを行わない等、水管理に注意し、水系への農薬の流出を防ぐこと。

③畦畔等除草剤の種類と適用場所

| 除草剤名            | 適用場所 |     |     |    | 方法     | 適用雑草       |
|-----------------|------|-----|-----|----|--------|------------|
|                 | 耕起前  | 刈取跡 | 休耕田 | 畦畔 |        |            |
| グラスショート液*1      |      |     |     | ○  | 雑草茎葉散布 | 一年生及び多年生雑草 |
| ザクサ液            | ○*2  | ○*2 |     | ○  |        |            |
| タッチダウン i Q液     | ○*2  | ○   | ○   | ○  |        |            |
| バスタ液            | ○*2  | ○*2 | ○   | ○  |        |            |
| ラウンドアップマックスロード液 | ○    | ○   | ○   | ○  |        |            |

\*1：使用目的は「草丈抑制による刈り取り軽減」

\*2：適用雑草は「一年生雑草」

④畦畔等除草剤使用指針

| 除草剤名            | 使用時期                       | 10a当たり使用量 / 散布液量                                                 |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| グラスショート液        | 雑草生育初期及び草刈り後10～20日(収穫前日まで) | 300～500mL/ 通常散布 50～100 L<br>少量散布 25 L                            |
| ザクサ液            | 収穫7日前まで(雑草生育期)             | 一年生及び多年生<br>500～1000mL/100～150 L                                 |
| タッチダウン i Q液     | 畦畔:収穫14日前まで(雑草生育期)         | 一年生:250～500mL/50～100 L<br>多年生:500～1000mL/50～100 L                |
|                 | 休耕田:雑草生育期                  | 一年生:250～500mL/50～100 L<br>多年生:500～1000mL/50～100 L                |
|                 | 水田作物刈取後(雑草生育期)             | 一年生:250～500mL/25～100 L<br>多年生:500～1000mL/25～100 L                |
| バスタ液            | 畦畔:収穫7日前まで                 | 一年生及び多年生<br>500～1000mL/100～150 L                                 |
|                 | 休耕田:雑草生育期                  | 一年生及び多年生<br>500～1000mL/100～150 L                                 |
|                 | 刈跡:雑草生育期                   | 一年生:300～500mL/100～150 L                                          |
| ラウンドアップマックスロード液 | 雑草生育期(収穫前日まで)              | 一年生:200～500mL<br>多年生:200～1000mL<br>通常散布:50～100 L<br>少量散布:25～50 L |