

家保通信

Vol. 39 No. 1 4月号
東京都家畜保健衛生所

令和7年3月26日

かほクイズ

アカバネ病の症状はどれ？

- ①流産
- ②発咳（咳が出る）
- ③水疱（水ぶくれ）

！韓国で口蹄疫が発生しました！

韓国の牛農場で口蹄疫が発生し、3月23日時点で14件が確認されています。韓国では、2023年以来の発生です。口蹄疫は、口蹄疫ウイルスによる偶蹄類（牛、豚、山羊、めん羊、水牛など）の伝染病で、発症すると発熱、泡状のよだれや口腔内・舌・鼻・蹄冠部・乳頭の水疱等の症状が認められます。口蹄疫の感染力は強く、韓国では3月14日の発生以降急速に発生が拡大しています。平成22年の宮崎県での発生以来、国内での発生はありませんが、本病の国内への侵入リスクは非常に高まっています。飼養者の皆様は、別添のリーフレットを参照の上、飼養衛生管理基準の遵守徹底をお願いします。なお、口蹄疫ウイルスには塩素系や消石灰等の消毒薬が有効で、逆性せっけんやアルコール系の消毒薬は効果がありません。消毒薬は用法用量を守って使用してください。

令和6年度牛のアルボウイルス感染症サーベイランス結果

アルボウイルス感染症とは、ヌカカ等の吸血昆虫が媒介するウイルスによる感染症です。毎年6月～11月にかけて、全国で発生状況の調査を実施しています。以下の図は、アカバネ病、チュウザン病、アイノウイルス感染症の抗体検査の結果です。東京都ではアカバネ病の検査を実施し、都内へのウイルス侵入は確認されませんでした。ご協力ありがとうございました。今年度の陽性地域は西日本のみでしたが、過去には東京都や北海道でも陽性が認められたことがあります。都内においても発生の可能性はあることから、今後も継続したワクチン接種を行ってください。

アカバネ病


高知県・岡山県で陽転

チュウザン病

中国・四国・九州地方・沖縄県の7県で陽転
(近縁のデアギュラウイルスの感染による可能性が高い)

アイノウイルス感染症

九州地方・沖縄県の8県で陽転



農水省より引用



ランピースキン病ワクチン接種県由来の牛肉の米国への輸出再開

3月19日、ランピースキン病ワクチンの接種を行う県（福岡県）に由来する牛肉の米国向け輸出が再開されました。

<これまでの経緯>

令和6年11月 6日 国内初のランピースキン病発生

11月21日 福岡県でワクチン接種開始

12月19日 ワクチン接種県由来の牛肉の米国への輸出停止



牛トレーサビリティ業務の窓口が変わります

4月1日より、都内における牛トレーサビリティ業務の窓口が関東農政局東京都拠点から**本局（埼玉県さいたま市）**に一元化されることになりました。4月1日以降は、下記連絡先へお問い合わせください。なお、牛の個体識別番号に関する届出、耳標に関する問い合わせは従来どおり家畜改良センター個体識別部（TEL:0248-48-0596）に変更ありません。

〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館
関東農政局 消費・安全部 畜水産安全管理課
【TEL】048-740-5066 048-600-0600(代表) 【FAX】048-601-0548



「定期の報告」の提出期限がせまっています！

定期報告書の提出期限は以下のとおりです。忘れずに早めの提出をお願いします。報告様式を紛失の際は、HPから印刷するか当所までご連絡ください。

家畜所有者の区分	提出期限
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし	<u>令和7年4月15日まで</u>
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥および七面鳥	<u>令和7年6月15日まで</u>

クイズの答え：①流産

アカバネ病ウイルスは、成牛に感染した場合ほとんど症状を示しませんが、妊娠牛の胎子に感染した場合、流産や早産、死産、異常産（脊柱や四肢の湾曲などの体形異常や脳の欠損など）を引き起こします。ウイルスを媒介するヌカカは、夏期に発生する季節風によって海外から侵入すると考えられています。アカバネ病の予防には、ヌカカが増加する初夏より前にワクチンを接種することが重要です。

発行日 令和7年3月26日

編集発行  東京都家畜保健衛生所

<http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/nourin/shoku/animal/kaho/>

〒190-0182 東京都西多摩郡日の出町
大字平井2759

TEL :042-588-7171

携帯:090-6941-4315(緊急用)

