

家保通信

Vol. 39 No. 3 6月号
東京都家畜保健衛生所

令和7年5月28日

かほクイズ

家きんサルモネラ症の症状はどれでしょう？

- ①元気・食欲消失
- ②下痢
- ③産卵低下

群馬県で豚熱発生！

5月9日に群馬県前橋市の養豚場（約460頭）で豚熱が発生しました（国内99例目）。飼養者の皆様は、飼養衛生管理基準の遵守の徹底をお願いします。また、死亡数の増加、発熱、食欲不振、元気消失、下痢、紫斑、結膜炎等の異状を認めた際には速やかに当所までご連絡ください。


写真：農水省HP



元気がない



耳翼の紫斑



結膜炎

飼養衛生管理基準重点7項目

- 1 衛生管理区域を出入りする車両の消毒
- 2 衛生管理区域を出入りする者の手指消毒
- 3 豚舎を出入りする者の手指消毒
- 4 衛生管理区域内の整理整頓及び消毒
除草及び資材、機材等の整理整頓等を行い、ねずみ等の野生動物の隠れられる場所をなくす
- 5 衛生管理区域専用の衣服・靴の設置
- 6 豚舎ごとの専用の衣服・靴の設置
- 7 豚舎外での病原体による汚染防止
豚の飼養管理に必要なものを豚舎に持ち込まない。豚舎間を移動させる場合には、屋根、壁等のある場所を通るか、洗浄及び消毒済みのケージ、リフトを使う



サルモネラ検査・抗菌性薬剤残留調査のお知らせ

当所では、鶏を概ね100羽以上飼養している方を対象に、鶏卵と鶏舎環境のサルモネラ検査及び鶏卵の抗菌性薬剤残留調査を実施しています。今年度は6月～8月に実施予定です。対象の方には通知をお送りしますので、ご協力をお願いします。





吸血昆虫対策をしましょう！

サシバエやアブ等の吸血昆虫が活発化する時期となりました。吸血昆虫はランピースキン病や牛伝染性リンパ腫の感染経路の一つとして重要です。感染予防のため、以下の対策を実施しましょう。

◆発生源対策

①**牛糞の処理**：サシバエは家畜の糞便で発育します。牛舎や牛房の隅、子牛のハッチなど水分が多く有機物が残りやすい場所が発生源となります。

牛糞の適切な処理と小まめな**掃除**を行いましょう。

②**除草**：アブは草むらで産卵します。牛舎周囲の**除草**を実施しましょう。

◆薬剤の利用：用法用量を守って正しく使用しましょう

①**IGR剤**：サシバエの幼虫に有効です。幼虫が発生しやすい場所に対して月1回程度、散布しましょう。

②**ペルメトリン製剤**：サシバエやアブの成虫に有効です。週2回程度、牛体に直接噴霧しましょう。搾乳牛にも使用可能です。



業績発表会の集録をHPに公開しました！

当所では、日ごろの業務や調査、研究等の成果を取りまとめた発表会を毎年、開催しています。発表演題をまとめた集録をHPに公開していますので、ぜひご覧ください。

東京都HP：

<https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/shoku/eiseijyo/gyouhatu>



「定期報告」の提出をお願いします

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥の提出期限は**6月15日**です。なお、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの提出期限は**4月15日**です。ご提出ありがとうございました。未提出の方は早急に提出をお願いします。

クイズの答え：全部

ひなでは元気・食欲が消失、羽毛が逆立ち、嗜眠状態（刺激をやめると眠ってしまう状態）になります。しばしば白色下痢を排泄します。成鶏では無症状ですが、卵巣に病変が生じると産卵低下をおこすこともあります。

発行日 令和7年5月28日

編集発行  東京都家畜保健衛生所

<http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/nourin/shoku/animal/kaho/>

〒190-0182 東京都西多摩郡日の出町
大字平井2759

TEL：042-588-7171

携帯：090-6941-4315（緊急用）

