

3. 常温煙霧に使用できる薬剤の種類と主な適用作物および病害虫

薬剤名	希釈倍数 ・使用量	使用基準									対象 病害虫名		
		野 菜 類	キ ュ ウ リ	メ ロ ン	ト マ ト	ミ ニ ト マ ト	ナ ス	ビ ー マ ン	イ チ ゴ	ブ ドウ			
Zボルドー	294～588g/10a		-/-									べと病	
アグロケア水	1000倍	1/-							-/-			すすかび病 灰色かび病	
アフエットFL	150g/10a			1/3								うどんこ病 すすかび病	
スマレックス水	200g/10a			1/2								灰色かび病	
	250g/10a								1/6				
ダコニール 1000FL	33倍			1/12								べと病	
						1/4		1/4				うどんこ病	
						1/4							すすかび病
						1/4							葉かび病
	50倍									1/3		褐色輪紋病 うどんこ病	
フルピカFL	イチゴ50倍, 100倍 キュウリ 67倍 ナス 67倍			1/4					1/4		1/3	うどんこ病	
ベルコートFL	150ml/10a			1/7								うどんこ病、褐斑病、菌 核病、黒星病、炭疽病、 灰色かび病	
									1/3			うどんこ病、褐紋病、黒 枯病、すすかび病、灰色 かび病	
ベンレート水	150g/10a			1/3		1/5						灰色かび病	
ボトキラー水	300g/10a	*b/-										灰色かび病	
モレスタン水	50～100g/10a			1/3								うどんこ病	
	100g/10a				3/10								
ロブラール水	200g/10a			1/4		1/3	1/3				*a/3	灰色かび病	
アドマイヤー水	100g/10a			1/3					1/2			アブラムシ類	
	200g/10a										21/2	アザミウマ類	
コテツFL	150ml/10a										14/2	チャノキイロザミウマ	
コロマイト水*1	100g/10a								1/2			ハダニ類	
	150g/10a										7/2		
ウララDF	いちご100g/10a トマト、ミニトマ ト100～150g/10a					1/3	1/3				1/2	アブラムシ類、コナジラ ミ類	
ショウチノスケ FL	66倍			1/2					1/2			うどんこ病	
ダブルシュー ターSE	250g/10a			1/2								アザミウマ類	
ファインスナイ パー	70倍			1/2								アザミウマ類	
ダコニールアル ファ	100倍			1/12								べと病	
ベンレート水	150g/10a					1/5			1/4			うどんこ病 灰色かび病	

凡例…収穫前日数 / 使用可能回数 *1:大粒種ブドウのみ適用

*a:開花期～幼果期、但し、収穫60日前まで *b:発病前～発病初期

4. 専用電気加熱式くん煙器使用による薬剤と主な適用作物および病害虫

薬剤名	使用量	対象作物	対象病害虫名
硫黄粒剤*	6～16 g/2000㎡ (高さ2m、床面積1000㎡)	トウガラシ類、カボチャ、キュウリ、スイ カ、メロン、トマト、ミニトマト、ナス、 ピーマン、イチゴ、バラ	うどんこ病
	10～16 g/2000㎡ (高さ2m、床面積1000㎡)	キク	白さび病

*:商品によって作目の登録が異なる場合がありますので必ず商品のラベル等を確認してから使用する。