

クワシロカイガラムシ第一世代の防除対策について

令和7年4月25日
東京都病虫害防除所

チャのクワシロカイガラムシ第一世代の防除時期についてお知らせします。
下記の情報を参考に防除対策を行いましょう。

1 クワシロカイガラムシ第一世代のふ化盛期（50%ふ化卵塊率が半数となる時期）予測

（1）有効積算温度シミュレーションによる第一世代ふ化盛期予測（4月25日現在）

地域	ふ化盛期予測日※
青 梅	5月13日
府 中	5月7日

※青梅と府中のアメダスデータを用いた（4月25日以降は平年値）。

（2）気象予報

4月24日発表の気象庁1ヶ月予報によると、気温は平年より高くなると予想されています。

気温が高くなるとふ化盛期が予測より早まる可能性があります。ご注意ください。

2 防除対策

（1）防除適期はふ化盛期から数日間とされています。

ほ場を丁寧に見回り、枝幹につく幼虫のふ化状況を確認して防除適期を逃さないようにしましょう。

（2）積算温度はほ場毎に異なります。ふ化盛期予測日は目安として活用してください。

（3）薬剤散布は、株内の枝や株元に薬液が十分にかかるよう丁寧に行いましょう。

農薬は必ずラベルの表示を確認して、正しく使用してください