

病虫害発生予察情報

4月月報

令和5年5月17日
東京都病虫害防除所

1 気象概況（東京都・東京管区气象台提供）

2023 年 4 月	気 温						降 水 量 (mm)		日 照 時 間 (h)	
	最 高		最 低		平 均					
	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年比 (%)	本年	平年比 (%)
上旬	20.1	2.6	8.1	1.4	14.4	2.3	4.0	9	66.0	106
中旬	22.3	3.1	10.3	1.5	16.4	2.5	28.5	66	70.4	125
下旬	20.3	-0.3	11.6	1.1	16.2	0.6	24.5	74	58.0	94
平均	21.0	1.8	10.0	1.3	15.7	1.8				
合計							57.0	47	194.4	108

※ 観測地：東京都府中市 気象庁気象観測所

※ 平年差（比）：平年値（1991～2020年の平均値）からの差（比）

<天気概況>

上旬：高気圧に覆われ晴れの日が多かったが、中頃は低気圧や前線の影響で曇りや雨の日があった。期間の中頃までは、暖かい空気に覆われることが多く、気温のかなり高い日があった。

中旬：高気圧に覆われ晴れの日が多かったが、中頃は低気圧や上空の寒気の影響で大雨や雨となり、雷や雹を伴った日もあった。期間のはじめと終わりには暖かい空気に覆われ、気温のかなり高い日があった。

下旬：高気圧と低気圧や、前線が交互に通過したため、天気は数日の周期で変化した。

2 作物生育概況

（1）野菜類

果菜類：促成、半促成トマトの生育は概ね順調だった。

葉菜類：ハウレンソウ、コマツナの生育は概ね順調だった。

根菜類：ダイコン、コカブの生育は概ね順調だった。

イモ類：ジャガイモの生育は概ね順調だった。

（2）果樹

ナシ：東京都農林総合研究センターの果樹圃場（灰色低地土）における主要品種の開花期と平年差（カッコ内）は以下のとおりであった。開花始期および開花盛期は10日以上早くなった。

新高：開花始 3月25日（－11日） 開花盛 4月9日（－11日）

稲城：開花始 3月27日（－10日） 開花盛 3月31日（－10日）

幸水：開花始 3月31日（－12日） 開花盛 4月3日（－12日）

豊水：開花始 3月31日（－10日） 開花盛 4月3日（－10日）

（3）茶樹

昨秋や春に整枝を行っている圃場の生育が早く、あまり整枝剪定を行っていない圃場の芽出しは遅かった。例年より整枝剪定の有無による生育差が大きくなった。

3 病害虫の発生概況

（1）果樹の病害虫

ナシ

赤星病 < 少 > 発生は少なかった。

アブラムシ類 < 少 > 発生は少なかった。

ハマキムシ類 < 少 > 発生は少なかった。

果樹共通

チャバネアオカメムシ < 発生時期：並 発生量：並 >

（2）茶樹の病害虫

カンザワハダニ < やや少 > 発生はやや少なかった。

（3）野菜の病害虫

トマト（施設）

モザイク病 < 少 > 発生は少なかった。

灰色かび病 < 並 > 発生は平年並であった。

葉かび病 < やや少 > 発生はやや少なかった。

コナジラミ類 < 少 > 発生は少なかった。

アブラムシ類 < 少 > 発生は少なかった。

アザミウマ類 < やや少 > 発生はやや少なかった。

コマツナ（施設）

コナガ < 少 > 発生は少なかった。

ハモグリバエ類 < 少 > 発生は少なかった。

ヤサイゾウムシ < 少 > 発生は少なかった。

コマツナ（露地）

白さび病 < 少 > 発生は少なかった。

コナガ < 少 > 発生は少なかった。

ハウレンソウ

べと病 < 少 > 発生は少なかった。

ケナガコナダニ < 少 > 発生は少なかった。

アブラムシ類 < 少 > 発生は少なかった。

イチゴ（施設）

灰色かび病 < やや少 > 発生はやや少なかった。

うどんこ病 < 少 > 発生は少なかった。

アブラムシ類 < 少 > 発生は少なかった。

ハダニ類 < やや少 > 発生はやや少なかった。

チャノホコリダニ < 少 > 発生は少なかった。

ネギ

さび病	< やや少 >	発生はやや少なかった。
アブラムシ類	< 少 >	発生は少なかった。
アザミウマ類	< 並 >	発生は平年並であった。
ネギハモグリバエ	< 少 >	発生は少なかった。
ネギコガ	< 少 >	発生は少なかった。

キャベツ

菌核病	< 少 >	発生は少なかった。
コナガ	< 少 >	発生は少なかった。
アブラムシ類	< 少 >	発生は少なかった。

野菜共通の病害虫

トビムシ類	< 少 >	発生は少なかった。
クローバーハダニ	< 少 >	発生は少なかった。

(4) 花きの病害虫 (施設)

花き共通の病害虫

灰色かび病	< 並 >	発生は平年並であった。
アブラムシ類	< 少 >	発生は少なかった。
アザミウマ類	< 少 >	発生は少なかった。
コナジラミ類	< 少 >	発生は少なかった。
ハモグリバエ類	< 少 >	発生は少なかった。
ハダニ類	< 少 >	発生は少なかった。

(5) 島しょの病害虫

島しょ地域では多発生の病害虫は認められなかった。

4 侵入調査

チチュウカイミバエ	< 誘殺なし >
ウリミバエ	< 誘殺なし >
クインズランドミバエ	< 誘殺なし >
ミカンコミバエ種群	< 誘殺なし >
トマトキバガ	< 誘殺なし >

病害虫防除所ホームページ

<https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/shoku/anken/boujyo/>

病害虫の発生予察情報、発生状況、防除方法、
防除のポイントなどをお知らせしています。