

X 東京都内における化学合成農薬・化学肥料慣行使用基準

令和 8 年 4 月現在

| 種類 | 農産物名 | 作型 | 化学合成農薬 (延べ使用成分回数) | 化学肥料 (窒素成分kg/10a) | 備考 |
|---------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|----|
| 作物 | 水稲 | 普通 | 7 | 5 | |
| | 小麦 | 普通 | 3 | 5 | |
| 野 | アイソブラント | 春～冬まき | 4 | 12 | |
| | アシタバ | 普通 | 3 | 40 | |
| | アスパラガス | 半促成長期どり | 8 | 15 | |
| | イチゴ | 促成（施設） | 31 | 30 | |
| | ウド | 促成・普通軟化 (根株養成含む) | 8 | 16 | |
| | エダマメ | 早熟・普通 | 5 | 10 | |
| | | 抑制 | 6 | 6 | |
| | オクラ | 普通 | 5 | 20 | |
| | カボチャ | 普通 | 2 | 15 | |
| | カリフラワー | 夏まき | 12 | 20 | |
| | キャベツ | 春まき夏どり | 15 | 25 | |
| | | 夏まき秋冬どり | 15 | 25 | |
| | | 秋まき初夏どり | 15 | 25 | |
| | キュウリ | 半促成（施設） | 20 | 25 | |
| | | 早熟・普通（露地） | 18 | 25 | |
| | | 抑制（施設） | 18 | 20 | |
| | ケール | 春まき・夏まき | 5 | 25 | |
| | コカブ | 冬まき・春まき | 6 | 15 | |
| | | 夏まき・秋まき | 10 | 15 | |
| | ゴボウ | 普通 | 5 | 12 | |
| | コマツナ | 春～秋まき（露地） | 7 | 15 | |
| | | 春～秋まき（施設） | 7 | 7 | |
| | | 冬まき（露地） | 5 | 15 | |
| | | 冬まき（施設） | 5 | 7 | |
| | | 大型（施設） | 11 | 25 | *1 |
| | サツマイモ | 普通 | 10 | 3 | |
| | サトイモ | 普通 | 4 | 20 | *2 |
| サヤインゲン | 普通 | 10 | 10 | | |
| | 抑制（施設） | 5 | 10 | | |
| サヤエンドウ | 秋まき | 3 | 10 | | |
| | 秋まき（島しょ） | 18 | 24 | *3 | |
| シシトウ | 普通 | 7 | 18 | | |
| ジャガイモ | 春作 | 4 | 15 | | |
| | 秋作 | 5 | 20 | | |
| シュンギク | 秋まき | 3 | 14 | | |
| ショウガ | 半促成・普通 | 10 | 15 | | |
| スイートコーン | 早熟・普通 | 7 | 18 | | |
| スイカ | 早熟 | 16 | 12 | | |

| 種類 | 農産物名 | 作型 | 化学合成農薬 (延べ使用成分回数) | 化学肥料 (窒素成分kg/10a) | 備考 |
|--------|----------------|-----------|----------------------|----------------------|-------|
| 野 | ズッキーニ | 早熟・普通 | 8 | 13 | |
| | | 春まき | 8 | 15 | |
| | ダイコン | 夏まき・秋まき | 8 | 20 | |
| | | 冬まき | 8 | 15 | |
| | タマネギ | 秋まき | 9 | 17 | |
| | チンゲンサイ | 春まき・夏まき | 4 | 9 | |
| | | 秋まき・冬まき | 4 | 13 | |
| | トマト | 促成(施設) | 36 | 30 | *4 |
| | | 半促成(施設) | 17 | 30 | *4 |
| | | 早熟・普通(露地) | 17 | 25 | *4 |
| | | 抑制(施設) | 17 | 15 | *4 |
| | | 小笠原(施設) | 11 | 40 | *4 *5 |
| | ナス | 早熟 | 39 | 40 | |
| | ナバナ類 | 秋まき | 3 | 22 | |
| | ニガウリ | 普通 | 3 | 11 | |
| | ニンジン | 春まき | 8 | 20 | |
| | | 夏まき | 8 | 20 | |
| | ニンニク | 普通 | 6 | 15 | |
| | ネギ | 春まき | 18 | 20 | *6 |
| | | 夏まき | 18 | 20 | |
| | | 秋まき | 18 | 20 | |
| | | 冬まき | 18 | 20 | |
| | ハクサイ | 秋まき | 11 | 16 | |
| | 葉ショウガ | 半促成・普通 | 10 | 15 | |
| | 葉ダイコン | 春まき | 3 | 14 | |
| | | 秋まき | 2 | 14 | |
| | ピーツ (かえんさい) | 春～秋まき | 1 | 14 | |
| ピーマン | 早熟 | 13 | 20 | | |
| 非結球レタス | 春まき | 5 | 16 | | |
| | 夏まき | 6 | 10 | | |
| | 秋まき・冬まき | 5 | 13 | | |
| ブロッコリー | 春まき | 10 | 25 | | |
| | 夏まき | 10 | 25 | | |
| | 冬まき | 6 | 20 | | |
| ホウレンソウ | 春～初秋まき | 7 | 14 | | |
| | 秋まき・冬まき | 4 | 15 | | |
| ミズナ | 春～秋まき | 5 | 14 | | |
| | 冬まき | 4 | 8 | | |
| ミニトマト | 促成(施設) | 36 | 30 | *4 | |
| | 半促成(施設) | 17 | 30 | *4 | |
| | 早熟・普通(露地) | 17 | 25 | *4 | |
| | 抑制(施設) | 17 | 15 | *4 | |
| | 小笠原(施設) | 11 | 40 | *4 *5 | |
| 菜 | | | | | |

| 種類 | 農産物名 | 作型 | 化学合成農薬 (延べ使用成分回数) | 化学肥料 (窒素成分kg/10a) | 備考 |
|-------------|-----------|-------------|----------------------|----------------------|-------|
| 野 | モミジガサ | 普通 | 0 | 0 | *7 |
| | モロヘイヤ | 早熟・普通 | 2 | 14 | |
| | ヤマノイモ | 普通 | 8 | 20 | *8 |
| | ラッカセイ | 普通 | 4 | 5 | |
| | ラッキョウ | 普通(1年掘り) | 3 | 20 | |
| 菜 | ルッコラ | 春まき・秋まき | 8 | 14 | |
| | レタス | 春まき・夏まき・秋まき | 8 | 12 | |
| | | 冬まき | 2 | 20 | |
| 果 | イチジク | | 10 | 24 | |
| | ウメ | | 8 | 18 | |
| | 温州ミカン | | 13 | 25 | |
| | カキ | | 10 | 14 | |
| | キウイフルーツ | | 11 | 16 | |
| | クリ | | 4 | 5 | |
| | ナシ | | 36 | 30 | |
| | ブドウ | | 29 | 8 | |
| | ブルーベリー | | 4 | 10 | |
| | パッションフルーツ | 施設 | 5 | 20 | |
| 樹 | ユズ | | 6 | 18 | |
| | リンゴ | | 35 | 12 | |
| | レモン | 露地(島しよを除く) | 12 | 20 | *9 |
| | | 島しよ | 14 | 30 | *3 |
| | | 長期樹上着果(島しよ) | 21 | 40 | *3*10 |
| 工 作 物 | 食用つばき(種子) | | 1 | 2 | |
| | 茶 | | 12 | 45 | |

| 種類 | 農産物名 | 作型 | 化学合成農薬 (延べ使用成分回数) | 化学肥料 (窒素成分kg/10a) | 備考 |
|----|-------------|----------|----------------------|----------------------|--------|
| 野菜 | イチゴ(養液栽培) | 促成(施設) | 31 | / | *11 |
| | トマト(養液栽培) | 促成長期(施設) | 34 | | *4 *11 |
| | ミニトマト(養液栽培) | 促成長期(施設) | 34 | | *4 *11 |

(注) 化学合成農薬の使用回数は、有効成分の延べ回数、化学肥料は窒素成分(kg/10a)。

*1: 草丈が概ね35cm以上のコマツナに限る。なお、同一生産者による「大型コマツナ」と「通常サイズのコマツナ」の認証取得を認めるが、栽培開始時から区別して栽培すること(栽培期間中にその区別することは認めない)。

*2: サトイモには、エビイモ、タケノコイモ、ヤツガシラを含む。

*3: 島しよに限る。

*4: トマト、ミニトマトに使用するトマトトーンは、直接花房及びび花へそれぞれ1回処理するものであるため、回数は他の農薬とは違い、生育期全体を通じて1回としてカウントすることとする。

*5: 小笠原諸島に限る。

*6: ネギには、九条ネギ、加賀太ネギ、千住ネギ、ヤグラネギ、下仁田ネギ、リーキ、ワケネギを含む。

*7: モミジガサの認証対象は栽培したものに限り、また、化学合成農薬及び化学肥料が栽培期間中不使用のものについてのみ認証する。

*8: ヤマノイモには、ヤマトイモ、自然薯、丸イモ、ナガイモ、トックリイモ、イセイモ、イチョウイモ、ツクネイモ、ダイジョを含む。

*9: 島しよを除く地域に限る。

*10: 開花から収穫まで概ね9ヵ月以上のものに限る。

*11: 養液栽培の認証基準に適合したものに限り。