

マルメロ、カリン(果樹類、落葉果樹の登録農薬も使用できる)

マルメロ

薬剤名	作用機 構分類 コード	人 畜 毒 性	使用 時期 (日数)	使 用 回 数	赤 星 病	ご ま 色 斑 点 病	黒 点 病	腐 ら ん 病	ゆ 合 促 進	ア ブ ラ ム シ 類	シ ン ク イ ム シ 類
I Cボルドー412FL	M1		-	-		◎					
トップジンM水	1		1	6			◎				
トップジンMペースト	1		*c	3					◎		
スコア顆水	3		7	3		◎					
トリフミン水	3		14	3	◎						
オキシンドー水80	M1		14	4			◎				
キノンドー水80	M1		14	4		◎	◎				
オーソサイド水80	M4		14	6			◎				
ダコニール1000FL	M5		30	4		◎					
ベフラン液25	M7	劇	*a	*b				◎			
サイアノックス水	1B		45	2						◎	◎
アディオンFL	3A		14	2							◎

*a:展葉期 *b: 4回以内(但し開花期以降散布は3回以内)

*c:剪定整枝時、病患部削り取り直後及び病枝切除後

カリン

薬剤名	作用機 構分類 コード	人 畜 毒 性	使用 時期 (日数)	使 用 回 数	赤 星 病	ご ま 色 斑 点 病	黒 点 病	腐 ら ん 病	白 か び 斑 点 病	ゆ 合 促 進	シ ン ク イ ム シ 類	ナ シ ヒ メ シ ン ク イ
トップジンM水	1		1	6				◎				
トップジンMペースト	1		*c	3						◎		
トリフミン水	3		1	3	◎							
オキシンドー水80	M1		14	4			◎					
キノンドー水80	M1		14	4		◎	◎					
ダコニール1000FL	M5		45	3		◎	◎		◎			
ベフラン液25	M7	劇	*a	*b				◎				
アディオン水	3A		3	3							◎	◎
モスピラン顆溶	4A	劇	14	2								◎

*a:展葉期 *b: 4回以内(但し開花期以降散布は3回以内)

*c:剪定整枝時、病患部削り取り直後、及び病枝切除後