

トウガラシ類\*<sup>1</sup> (作物群登録)(野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用 機構 分類 コード	人 畜 毒 性	使 用 時 期 (日 数)	使 用 回 数	疫 病	う ど ん こ 病	斑 点 病	灰 色 か び 病	黒 枯 病	炭 疽 病	菌 核 病	苗 立 枯 病	斑 点 細 菌 病
トリフミン水	3		1	5		◎							
ラリー水	3		1	4		◎	◎						
カンタスDF	7		1	2				◎	◎				
スクレアFL	11		1	3						◎	◎		
ストロビーFL	11		1	2		シ							
ライメイFL	21		1	3	◎								
ランマンFL	21		1	4	◎								
ロブラール水	2		3	2				シ					
オリゼメート粒	P2		*a	1		◎	◎						
サンヨール乳	M1		1	4		甘							
オーソサイド水80	M4		*b	2								◎	
ユニフォーム粒	4・11		1	1	シ								
シグナムWDG	7・11		1	2		◎		◎	◎	◎			
カスミンボルドー水	24・M1		1	5		◎	◎						◎

\*1: トウガラシ類…「農薬使用に関するよくあるお問い合わせ」(P.71)を参照のこと。

\*a: 定植時 \*b: 播種後～2～3葉期まで

シ: シシトウを除く

甘: 甘長トウガラシのみに適用

トウガラシ類\*<sup>1</sup>(作物群登録)(野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒毒性	使用時期(日数)	使用回数	アブラムシ類	コナジラミ類	アザミウマ類	ミナミキイロアザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ類	タバコガ類	オオタバコガ	ハスモンヨトウ類	ネキリムシ類	コガネムシ類	ケラ	チャノホコリダニ	ハダニ類
スピノエース顆水	5		1	2			甘	甘	甘								
コロマイト乳	6		1	1		甘											
アドバンテージ粒	1A	劇	*c *a	1				◎	◎								
オンコル粒5	1A		*d	1				◎									
ダイアジノン粒5	1B		*f *b	3 2								◎		◎			
アディオン乳	3A		7	2	◎					タ							
アーデント水	3A		1	2	◎				◎								◎
アクタラ顆溶	4A		1	3	シ												
アクタラ粒5	4A		*a	1	◎												
アドマイヤー顆水	4A	劇	*j	2	◎		◎	◎	◎								
アドマイヤー1粒	4A		*a *c	1	◎ ◎		◎	◎	◎								
アルバリン顆溶 スタークル顆溶	4A		1	2	◎	◎	◎	◎	◎								
アルバリン粒 スタークル粒	4A		*e *a *g *h	1	◎ ◎ ◎ ◎	◎ 葉	◎ 葉	◎ 葉	◎ 葉								
ダントツ溶	4A		1	3	◎	◎		◎									
バリアード顆水	4A	劇	1	3	◎												
ベストガード溶	4A		1	3		◎											
ベストガード粒	4A		*a	1	シ			シ									
モスピラン顆溶	4A	劇	1	2	シ												
ディアナSC	5		1	2			◎										
アニキ乳	6		1	3		◎					◎	◎					◎
アフーム乳	6		7	2							◎						
コルト顆水	9B		1	2 3	ア 甘	ア 甘											
チェス顆水	9B		1	3	◎												
コテツFL	13	劇	1	2				シ	シ		シ						シ
カスケード乳	15		1	3				甘									
マッチ乳	15		1	4							◎						
ダニトロンFL	21A		1	1													◎
モベントFL	23		*i	1 1	灌 ◎	灌 ◎	灌 ◎	灌 ◎	灌 ◎								灌 ◎

トウガラシ類

# トウガラシ類\*1 (作物群登録) (野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	アブラムシ類	コナジラミ類	アザミウマ類	ミナミキイロアザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ類	タバコガ	オオタバコガ	ハスモンヨトウ類	ネキリムシ類	コガネムシ類	ケラ	チャノホコリダニ	ハダニ
フェニックス顆水	28		1	2							◎						
プレバゾンFL5	28		*i	1	灌						灌						
プレオFL	UN		1	2			◎	◎	◎	◎	◎						
サンヨール乳	-		1	4	甘												
アプロードエースFL	16・21A		1	2		◎											

\*1: トウガラシ類…「農薬使用に関するよくあるお問い合わせ」(P. 71)を参照のこと。

\*a: 定植時

\*b: 播種時又は定植時

\*c: 育苗期後半

\*d: 育苗期後半または定植時

\*e: 育苗期

\*f: 収穫開始14日前まで

\*g: 定植時(但し収穫30日前まで)

\*h: 生育期(但し収穫開始14日前まで)

\*i: 育苗期後半～定植当日

\*j: 収穫前日まで(但し露地栽培については開花期終了後から)

ア: 甘長トウガラシを除く

シ: シシトウを除く

甘: 甘長トウガラシのみに適用

葉: トウガラシ(葉)のみに適用

タ: タバコガ

灌: 灌注処理での登録

※トウガラシ(葉)は農薬取締法上は野菜類に分類される。葉を食用として収穫する場合、野菜類又はトウガラシ(葉)に登録がある農薬しか使用できない。

トウガラシ(葉)の登録における「使用時期(日数)」は、葉を収穫する前までの日数なので注意する。