

# ムギ類\*1 (作物群登録)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(回数)	使用回数	赤かび病	赤さび病	うどんこ病	さび病	斑葉病	裸黒穂病	条斑病	黒点病	なまぐさ黒穂病	眼紋病	雲形病	黄斑病	網斑病	アブラムシ類	ヒメトビウモンカ	ムギアカタマバエ	ムギキモグリバエ	アワヨトウ
カリグリーン溶	NC		1	-			◎															
撒粉ボルドー粉DL	M1		-	-	◎																	
イオウFL	M2		*c	-	◎	◎																
クムラス顆水	M2		-	-	◎	◎	◎															
コロナFL	M2		-	-	◎	◎	◎															
サルファーゾル	M2		*c	-	◎	◎	◎															
石灰硫黄合剤	M2		-	-	◎	◎	◎															
トップジンM水	1		30	*b	ム	ム							ム									
トップジンM粉DL	1		14	*b	ム																	
カナメFL	7	劇	7	2		◎	◎															
バシタック水75	7		30	2				◎														
バシタック粉	7		30	2				◎														
ストロビーFL	11		14	3	ム	ム	ム															
トリフミン水	3		14	3	◎		◎			◎	◎		◎				◎					
ワークアップFL	3		7	3	◎	◎	◎					◎				◎	◎					
ワークアップ粉DL	3		7	3	◎	◎	◎										◎					
コナケシ顆水	U6		7	2			◎															
ベフラン液25	M7	劇	*a	1					ム		ム	ム					ム					
ベンレートT水20	1・M3		*a	1				◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎							
ホームイ水	1・M3		*a	1					ム			ム										
スミトップM粉	1・1B		14	1	ム	ム												ム	ム	ム		
スミチオン乳	1B		14	1														オ			オ	オ
アグロスリン乳	3A	劇	21	3														◎				
トレボン乳	3A		14	2														◎	◎			
モスピラン顆溶	4A	劇	7	2														◎				

\*1:ムギ類…「農薬登録における適用作物名について」(P.42)を参照のこと。

\*a:播種前

\*b:3回以内(出穂期以降は1回以内)

\*c:発病前～発病初期

オ:大麦、小麦を除く

ム:小麦を除く