

# ナバナ類\*1 (野菜類、非結球アブラナ科葉菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機 構分類 コード	人 畜 毒 性	使 用 時 期 (日 数)	使 用 回 数	使 用 条 件	べ と 病	黒 斑 病	白 斑 病	菌 核 病	白 さ び 病	根 こ ぶ 病	黒 腐 病	軟 腐 病
カンタスDF	7		7	1					◎				
ストロビーFL	11		1	2						◎			
アリエッティ水	P7		1	2						な			
ネビジン粉	36		*a	1							◎		
			*d							◎			
			*e							◎			
ランマンFL	21		3	3					◎				
			*b	1	☆						◎		
フロンサイド粉	29		*a	1							な		
カスミン液	24		14	3									◎
ヨネポン水	M1		14	3						◎			◎
ダコニール1000FL	M5		*c	3		な	な	な		な			
			60	3		ナ	ナ	ナ		ナ			
カップーシン水	24・M1		14	3								◎	

\*1:ナバナ類…「農薬登録における適用作物名について」(P.42)を参照のこと。

\*a:播種又は定植前 \*b:定植前日～当日 \*c:出蕾前(但し収穫21日前まで)

\*d:播種前 \*e:定植前

な:なばなのみに適用

ナ:なばなを除く

☆:セル成型育苗トレイまたはペーパーポットで育苗している苗に灌注処理する。なお、この使用方法は、土耕栽培による苗には使用できない。

ナバナ類\*1 (野菜類、非結球アブラナ科葉菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機 構分類 コード	人畜 毒害 性	使用 時期 (日数)	使用 回数	使用 条 件	ア ブ ラ ム シ 類	ア ザ ミ ウ マ 類	ハ モ グ リ ハ エ 類	カ ブ ラ ハ バ チ	コ ブ ラ ナ ガ	ハ イ マ ダ ラ ノ メ イ ガ	ア オ ム シ	ヨ ト ウ ム シ 類	ハ ス モ ン ヨ ト ウ	ネ キ リ ム シ 類	キ ス ジ ノ ミ ハ ム シ	コ ガ ネ ム シ 類 幼 虫	ケ ハ ハ	ハ ク サ イ ダ ニ			
ダイアジノン粒5	1B		*b	1																		
			*b																			
			*c	1																		
アディオソ乳	3A		1	3						◎	◎											
ガードバイトA粒	3A		*d	3											◎							
スカウトFL	3A	劇	7	2										ヨ								
アドマイヤー顆水	4A		7	2		◎																
モスピラン顆溶	4A	劇	14	1		◎			◎								◎					
ディアナSC	5		1	2			◎			◎					◎					◎		
ラディアントSC	5		1	2			◎			◎					◎					◎		
アフーム乳	6		7	2						◎	◎	◎	ヨ	◎								
コテツFL	13	劇	3	2											◎							
カスケード乳	15		21	3				◎						◎	○							
ブリロソソ粒オメガ	28		*c	1		◎																
ブレバソンFL5	28		*a	1	☆							◎										
			1	3					◎	◎	◎											
ウララDF	29		1	2		◎																
プレオFL	UN		14	2						◎				◎								
ジュリボFL	4A・ 28		*a	1	☆	◎				◎	◎		◎									

\*1:ナバナ類…「農薬登録における適用作物名について」(P.42)を参照のこと。

\*a:育苗期後半～定植当日 \*b:播種時 \*e:定植時 \*h:生育初期

は:はなっこりーとなばなに適用

ハ:はなっこりーとなばなを除く

ヨ:ヨトウムシ

☆:セル成型育苗トレイまたはペーパーポットで育苗している苗に灌注処理する。なお、この使用方法は、土耕栽培による苗には使用できない。

ナ  
バ  
ナ  
類