

ニンニク (野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	作用機 構分類 コード	人畜 毒 性	使用 時期 (日数)	使 用 回 数	葉 枯 病	白 斑 病	黒 腐 菌 核 病	春 腐 病	さ び 病	白 絹 病	黄 斑 病	ア ザ ミ ウ マ 類	ア ブ ラ ム シ 類	ネ ギ コ ガ	チ ユ ー リ ッ プ サ ビ ダ ニ	イ モ グ サ レ セ ン チ ユ ウ
コサイド3000DF	M1		-	-				◎								
Zボルドー水	M1		-	-	◎			◎	◎							
アフエットFL	7		1	3	◎				◎							
			*a	1				塗								
パレード20FL	7		1	2	◎											
			*a	1				塗								
アミスター20FL	11		7	3	◎				◎							
ストロビーFL	11		7	3					◎							
ファンタジスタ顆水	11		7	3	◎	◎			◎		◎					
メジャーFL	11		*c	3					◎	◎						
スミレックス水	2		*a	1			◎									
オンリーワンFL	3		7	3	◎	◎					◎					
トリフミン水	3		1	3	◎											
モンガリット粒	3		*a	1			◎			◎						
			*d	2												
ラリー乳	3		3	3					◎							
バリダシン液5	U18		3	5				◎								
ジマンダイセン水	M3		7	5	◎	◎										
ペンコゼブ水	M3		7	5	◎											
ダコニール1000FL	M5		7	6	◎	◎			◎		◎					
バルコート水	M7		3	3	◎											
カセット水	31・24		7	2				◎								
ナレート水	31・M1		7	2				◎								
シグナムWDG	7・11		3	3	◎	◎			◎		◎					
ベジセイバーFL	7・M5		7	3					◎							
カスミンボルドー水	24・M1		7	5				◎								
アグリマイシシ-100水	25・41		7	3				◎								
テーク水	3・M3		7	3	◎	◎			◎							
ポリベリン水	19・M7		3	3	◎						◎					
ベンレートT水20	1・M3		*a	1			◎									◎
ホーマイ水	1・M3		*a	1			◎									◎
ハチハチ乳	39・21A	劇	7	2					◎			◎	◎	◎	◎	
エコマスターBT	11A		*b	-										◎		
フローバックDF	11A		*b	-										◎		
オルトラン水	1B		7	2							◎	◎				
ガードホープ液	1B	劇	*a	1											浸	
			60	1												灌
ジェイエース溶	1B		7	2								◎	◎			
ダイアジノン水34	1B	劇	14	3										◎		
ネマトリンエース粒	1B		*a	1												◎
ラグビーMC粒	1B		*a	1												◎
アデオオン乳	3A		1	2								◎	◎			
マブリック水20	3A	劇	3	2								◎	◎			
モスピラン顆溶	4A	劇	1	2							◎	◎	◎			
モベントFL	23		14	2											◎	
ベネビアOD	28		7	3								◎	◎	◎		
フェインセープFL	34	劇	1	2							◎					
ビーラム粒	-		*a	1												◎

*a: 植付前 *b: 発生初期 (但し収穫前日まで) *c: 抽苔始めから収穫前日

*d: 土寄せ時 (但し、収穫75日前まで) (茎葉展開期)

浸: 種球浸漬 灌: 土壌灌注 塗: 種球塗布