

平成 15 年度 病虫害発生予察情報 注意報 第 3 号

病虫害名：カンザワハダニ

対 象 作 物 ： チ ャ

1 . 注意報の内容


- (1) 対象地域 都内全域
- (2) 発 生 量 多
- (3) 防除時期 萌芽前

2 . 注意報発令の根拠

- (1) 3月中旬の巡回調査において、西多摩地域茶園のカンザワハダニ寄生葉率が1996～2003年の平均値，3.1 %に対し，26.3 %と大幅に高かった（図1のX）。この値は過去の値と比べ、きわめて高い。
- (2) 向こう1か月の平均気温は高く，降水量は平年並と予想され，今後も発生に好適な条件が継続すると予想される。
- (3) 春先に凍霜害が発生すると，被害が助長される恐れがある。

3 . 害虫の生態ならびに防除対策

- (1) 一番茶芽萌芽前（西多摩地域の萌芽平年日は4月20日前後である。なお，今年は暖冬のため早まる可能性があるので注意する）の防除を徹底する。なお，農薬の使用基準は厳守する（表1）。
- (2) 葉裏に寄生するので，薬剤散布の際は葉裏にもよくかかるようにする。
- (3) 今後の発生については，予察情報に注意する。
- (4) 不明な点については病虫害防除所，最寄りの農業改良普及センターに問い合わせる。



... : 平年値 (1996-2002 年); : 2003 年 ; X : 2004 年 (3 月 , 26.3 %) .
茶カンザワハダニ寄生率 (青梅市) .

表1 主な防除薬剤

薬 剤 名 () 内 : 魚毒性 / 劇 : 劇物	薬剤の系統	使 用 基 準		希釈倍率
		日数	回数	
オマイト乳剤 (C)	亜硫酸エステル	萌芽前/14	2	1500-2000
ニッソランV乳剤 (B劇)	カーバメート・有機リン	10	1	1000
ミルベノック乳剤 (C)	抗生物質	14	2	1000
ピラニカEW (C劇)	ピリミジフェン	21	1	1000-2000
ダニトロンフロアブル (C)	フェノキシピラゾール	14	1	1000
アクテリック乳剤 (B)	有機リン	7	1	1000
カネマイトフロアブル (B)	アセキノシル	7	1	1000
サンマイトフロアブル (C劇)	ピリダベン	14	2	1000
粘着くん液剤	デンブン	1	6	100
バロックフロアブル (A)	エトキサゾール	14	1	1000-3000
マイトコーネフロアブル (B)	ビフェナゼート	14	1	1000

.....
防除所ホームページ <http://www.jppn.ne.jp/tokyo>
 テレホンサービス 042 (525) 8407
 今後の予察情報にご注意下さい。
 E-mailアドレス S0200303@section.metro.tokyo.jp