

Date: 1999.09.29
Board: 21CHU
Body-part: 1,1464
Message-Id: 905
Delivery-date: 1999年9月29日(水) 9時52分 (JST)
Send-date: 1999年9月29日(水) 9時52分 (JST)
Subject: 99/09/21 注意報 野菜・花き類 ハスモンヨトウ並びにオオタバコガ
From: 東京防除所 <ktky0301>

平成11年 9月21日
東京都病虫害防除所

平成 1 1 年度 病虫害発生予察注意報 第 2 号

病虫害名：ハスモンヨトウ並びにオオタバコガ
対象作物：野菜・花き類

1．注意報の内容

- (1) 対象地域 都下全域
- (2) 作物名 野菜および花き類
- (3) 発生量 多

2．注意報発令の根拠

- (1) 立川市におけるフェロモントラップの誘殺数は、ハスモンヨトウは 8 月中に誘殺数が多かった。他方、オオタバコガは例年誘殺の少ない 8 月以降 9 月中旬まで誘殺数が多かった。
- (2) ハスモンヨトウおよびオオタバコガ両種によるキャベツ、ブロッコリ - 、ハクサイなどのアブラナ科野菜とナス、またハスモンヨトウによるサトイモ、ネギなど露地野菜で発生が多い圃場が認められた。
- (3) 両種とも、上記のほか多くの野菜・花き類を食害することが知られている。また食害は露地 には 1 1 月ごろまで続くと予想される。
- (4) 気象予報によれば、気温は平年より高く、日照時間は平年並と予想されるため発生は継続する。

3．防除対策

- (1) 両種とも老熟幼虫に対しては薬剤散布による防除効果が劣るので、早期発見に努め若齢幼虫 期に防除する。
- (2) ハスモンヨトウでは、卵塊や孵化直後の幼虫集団を速やかに取り除く。また、オオタバコガによるキャベツの被害は結球葉に数個の穴を開け内部で食害している場合が多く、発見が遅れるので注意する。
- (3) 主要作物のハスモンヨトウならびにオオタバコガの主要薬剤は別表 (省略) のとおりで、防除基準に従って薬剤を散布する。