

# ダイコン\*1 (野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	※つまみ菜・間引き菜	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	白さび病(又はワッカ症)	べと病	白斑病	炭疽病	亀裂クトニア菌(リゾクトニア菌)	根こぶ病	黒斑細菌病	軟腐病
サンボルドー水		M1		-	-		◎						
Zボルドー水	△	M1		-	-	白							
マスタピース水		-		1	-							◎	◎
スターナ水		31		14	5								◎
ハチハチ乳		39	劇	30	1	◎							
バシタック水75	×	7		21	3				◎				
アミスター20FL		11		14	3	◎							
メジャーFL	×	11		3	3	◎							
ライメイFL		21		7	4	◎							
ランマンFL		21		3	3	◎							
フロンサイドSC		29		*a	1				◎				
フロンサイド粉		29		*a	1				◎				
マイコシールド水		41		14	3								◎
リゾレックス粉	×	14		*a	1				◎				
ネビジン粉	×	36		*a	1					◎			
ピシロックFL	×	U17		1	2	◎							
バリダシン粉DL		U18		7	4				◎				
ヨネポン水		M1		7	4	白						◎	◎
ダゴニール1000FL		M5		45	3	◎		◎	◎				
ユニフォーム粒	△	4・11		*a	1	白							
カセット水		31・24		14	3							◎	◎
マテリーナ水		31・25		30	2								◎
ナレート水		31・M1		21	3								◎
アミスターオブティFL		11・M5		45	3	白							
カスミンバリダシン液		24・U18		14	3								◎
カスミンボルドー水	△	24・M1		14	3	ワ						◎	◎
キンセット水	△	M1・M1		21	3								◎

\*1:ダイコン(葉ダイコン、ダイコン菜を含む)と、ハツカダイコン(ラディッシュを含む)は、使用できる農薬が異なる。ハツカダイコンの防除農薬については、「ハツカダイコン」の項を参照のこと。

\*a:播種前 白:白さび病のみの登録 ワ:ワッカ症のみの登録

※つまみ菜・間引き菜に使用してはいけない農薬に「×」を、使用した場合の被害事例が公表されている農薬に「△」を付した。つまみ菜・間引き菜を収穫利用する場合には、これらの農薬を使用しないこと。印のない剤についても、使用にあたってはラベルの内容を確認し、使用基準を遵守すること。

ダイコン\*1(野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	※つまみ菜・間引き菜	作用機 構分類 コード	人畜 毒害 性	使用 時期 (日数)	使用 回数	ア ブ ラ ム シ 類	タ ネ バ エ 類	ハ モ グ リ バ エ 類	ナ モ グ リ バ エ 類	カ ブ ラ ハ バ チ 類	コ ブ ラ ハ バ チ 類	ア オ ム シ 類	ヨ ト ウ ム シ 類	ハ ス モ ン ヨ ト ウ シ 類	タ マ ナ ギ ン ム シ 類	ネ キ リ ン ム シ 類	ハ イ マ ダ ラ ノ メ イ ガ シ 類	キ ス ジ ノ ミ ハ ム シ 類	コ ガ ネ ム シ 類 幼 虫	ネ コ ブ セ ン チ ュ ウ 虫	ネ グ サ レ セ ン チ ュ ウ 虫	そ の 他 害 虫
スピノエース顆水		5		7	3						◎◎							◎				
エコマスターBT		11A		*i	-												◎					
エスマルクDF		11A		*i	-												◎					
フローバックDF		11A		*i	-												◎					
パイデートL粒	×	1A	劇	*c	1	◎														◎◎		
ラグビーMC粒	×	1B		*c	1													◎		◎◎		
オルトラン粒	×	1B		*c	1	◎					◎◎											
カルホス粉	×	1B		*a	1		◎									◎						
サイアノックス乳		1B		14	2	◎				◎◎◎		若		◎				成				
ジェイエース粒	×	1B		*c	1	◎					◎◎											
ダイアジノン粒5		1B		*a	1		◎									◎		◎			ケ	
				*f	2													◎				
				*g	1											◎						
ネキリエースK粒	×	1B		*d	1											◎						
ネマキック粒		1B		*c	1															◎		
ネマトリンエース粒	×	1B		*c	1															◎◎		
マラソン乳		1B		14	6	◎		ハ		◎		◎										
アグロリン水	3A	劇		7	5	◎				◎◎◎												
アディオン乳	3A			30	4	◎				◎◎◎						◎					サ	
ガードベイトA粒	3A			*b	4											◎						
サイハロン水	3A	劇		21	3	◎				◎◎◎												
トレボン乳	3A			21	3	◎				◎◎◎												
トレボンMC	3A			21	3	◎							◎									
トレボン粉剤DL	3A			21	3							◎									サ	
フォース粒	×	3A	劇	*a	1		◎											◎				
				14	1													◎				
マブリック水20		3A	劇	14	2	◎				◎◎◎◎												
アドマイヤーFL		4A	劇	14	2	◎																
アドマイヤー1粒	×	4A		*a	1	◎																
アクタラ顆溶	×	4A		7	2	◎																
アクタラ粒5	×	4A		*a	1	◎																
アルバリン顆溶		4A		7	2	◎												◎			サ	
スタークル顆溶	×	4A		7	2	◎																
アルバリン粒		4A		*a	1	◎												◎				
スタークル粒	×	4A		*h	1		◎											◎				
ダントツ溶		4A		7	2	◎															サ	
ダントツ粒		4A		*a	1	◎																
モスピラン顆溶		4A	劇	14	1	◎				◎◎◎								◎			サ	

ダイ  
コ  
ン

ダイコン\*1(野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	※つまみ菜・間引き菜	作用機 構分類 コード	人畜 毒 性	使 用 時 期 (日 数)	使 用 回 数	ア ブ ラ ム シ 類	タ ネ バ エ 類	ハ モ グ リ バ エ 類	ナ モ グ リ バ エ 類	カ ブ ラ ハ バ チ 類	コ ブ ラ ハ バ チ 類	ア オ ム シ 類	ヨ ト ウ ム シ 類	ハ ス モ ン ヨ ト ウ ム シ 類	タ マ ナ ギ ン ウ シ バ 類	ネ キ リ ン ウ シ バ 類	ハ イ マ ダ ラ ノ メ イ ガ シ 類	キ ス ジ ノ ミ ハ ム シ 類	コ ガ ネ ム シ 類 幼 虫	ネ グ サ レ セ ン チ ユ ウ 虫	ネ グ サ レ セ ン チ ユ ウ 虫	そ の 他 害 虫
モスピラン粒		4A		*a	1	◎					◎											
トランスフォームFL	×	4C			1	3	◎															
ディアナS C	×	5			1	2		◎		◎	◎	◎	◎		ウ		◎	◎				
アニキ乳		6			3	3				◎	◎						◎					
アフーム乳		6			7	3					◎	◎					◎					
コテツFL	△	13	劇	14	2						◎	◎										サ
パダンSG溶	△	14	劇	7	3	◎		◎		◎	◎	◎						◎				サ
リーフガード顆水		14	劇	14	2	◎				◎	◎						◎	◎				
アタブロン乳	△	15			14	3				◎	◎	◎	◎					◎				
カスケード乳		15			14	3					◎	◎						◎				
ノーモルト乳		15			21	2					◎	◎	◎									
マッチ乳		15			14	3					◎	◎										
ファルコンFL		18			3	3						◎	◎									
マトリックFL		18			7	3							◎					◎				
ハチハチ乳		21A	劇	30	1	◎		◎		◎	◎	◎					◎	◎				サ
トルネードエースDF	×	22A			21	2				◎	◎	◎	◎	◎				◎				
ファイントリムDF		22A			21	2				◎	◎	◎	◎	◎				◎				
アクセルFL		22B			7	2					◎			◎				◎	◎			サ
アクセルバイト粒		22B			7	2											◎					
フェニックス顆水		28			7	2						◎						◎				
ブリロソソ粒	×	28			*a	1	◎				◎	◎	◎				◎	◎				
ブレバソソFL5	×	28			1	3		◎		◎	◎	◎	◎					◎				
ベネビアOD	×	28			1	3	◎	◎		◎	◎	◎	◎					◎	◎			サ
ヨーバルFL	×	28			1	3					◎	◎						◎	◎			
ウララDF	×	29			1	2	◎															
グレーシア乳		30			7	2				◎	◎	◎						◎	◎			
プロフレアS C		30			1	3				◎	◎	◎	◎					◎	◎			サ
ファインセーブFL		34	劇	14	2						◎											
ブレオFL		UN			14	2				◎	◎	◎	◎									
ビーラム粒	×	-			*c	1														◎	◎	
アベイル粒	×	4A・ 28			*a	1	◎				◎	◎						◎	◎			
アフームエクセラ顆水		6・ 15			14	3					◎	◎						◎				

ダイコン

## ダイコン<sup>\*1</sup>(野菜類の登録農薬も使用できる)

\*1:ダイコン(葉ダイコン、ダイコン菜を含む)と、ハツカダイコン(ラディッシュを含む)は、使用できる農薬が異なる。ハツカダイコンの防除農薬については、「ハツカダイコン」の項を参照のこと。

\*a:播種時 \*b:播種時～生育初期 \*c:播種前 \*d:播種時または定植時  
\*f:播種時及び生育期(但し収穫21日前まで) \*g:生育期(但し収穫21日前まで)  
\*h:生育期(但し収穫30日前まで) \*i:発生初期(但し収穫前日まで)

ウ:ウワバ類 ケ:ケラ

サ:ダイコンサルハムシ(ダイコンハムシ)

ハ:ハモグリバエ

若:若～中齢幼虫 成:成虫

※つまみ菜・間引き菜に使用してはいけない農薬に「×」を、使用した場合の薬害事例が公表されている農薬に「△」を付した。つまみ菜・間引き菜を収穫利用する場合には、これらの農薬を使用しないこと。印のない剤についても、使用にあたってはラベルの内容を確認し、使用基準を遵守すること。