

病害虫発生予察情報
5 月月報

令和 6 年 6 月 17 日
東京都病害虫防除所

1 気象概況（東京都・東京管区气象台提供）

2024年 5 月	気温（℃）						降水量		日照時間	
	最高		最低		平均		(mm)		(h)	
	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年比	本年	平年比
								(%)		(%)
上旬	23.2	0.4	12.1	-0.4	17.7	0.3	38.5	114.9	70.7	118.2
中旬	24.4	1.2	13.7	0.2	19.1	0.9	85.5	197.9	63.3	116.4
下旬	26	1.1	17.1	1.9	21.3	1.5	40	70.9	44	67.3
平均	24.5	0.9	14.3	0.6	19.4	0.9				
合計							164	123.2	178	99.1

※ 観測地：東京都府中市 気象庁気象観測所
※ 平年差（比）：平年値（1991～2020 年の平均値）からの差（比）

＜天気概況＞

上旬：前線や低気圧と高気圧が交互に通リ、数日の周期で変化した。また、期 間中の気温の変動が大きく、気温がかなり高い日と気温がかなり低い日があった。

中旬：高気圧と低気圧が交互に通過し数日の周期で変化した。 東京の旬平均気温は高く、旬 間日照時間は平年並、旬降水量はかなり多くなった。

下旬：前半は高気圧に覆われ薄曇りや晴れの日が続き、後半は、前線を伴った低気圧 の影響で曇りや雨の日が多くなった。

2 作物生育概況

(1)イネ

6 月の田植えに向けて、育苗は順調である。

(2)野菜

果菜類:トマト、ナス、キュウリの生育はおおむね順調で、例年より早まっている。エダマメではカメムシが目立ち、スイートコーンではアワノメイガの発生が早い。

葉菜類:全般的に生育は順調である。コマツナではアザミウマ被害が目立つ。

イモ類:サトイモ、サツマイモともに順調である。ジャガイモの収穫が始まり、作柄は例年並み。

(3)果樹

農総研の果樹圃場(灰色低地土)におけるカキ主要品種の開花期と平年差(カッコ内)は以下の通り。開花始期及び開花盛期ともに、6～9日早かった。

平核無 :開花始 5月5日(－7日)、開花盛 5月9日(－6日)

東京紅 :開花始 5月9日(－8日)、開花盛 5月 13 日(－7日)

次 郎 :開花始 5月 10 日(－8日)、開花盛 5月 13 日(－8日)

松本早生:開花始 5月 12 日(－9日)、開花盛 5月 15 日(－9日)

(4) 茶樹

3月の気温が低かったが、4月以降温度が上がり、例年どおりの生育状況になった。目立った病害虫被害もなくおおむね順調である。

3 病害虫の発生概況

(1) 果樹の病害虫

ナシ

赤星病	< 少 >	発生は少なかった。
黒星病	< 少 >	発生は少なかった。
アブラムシ類	< 並 >	発生は平年並であった。
カメムシ類	< 多 >	予察灯、フェロモントラップによる誘殺数は、多かった。
ナシヒメシンクイ	< 並 >	発生は平年並みであった

(2) 茶樹の病害虫

カンザワハダニ	< 少 >	発生は少なかった。
チャノコカクモンハマキ	< 少 >	発生は少なかった。
チャハマキ	< 少 >	発生は少なかった。
チャノホソガ	< 少 >	発生は少なかった。

(3) 野菜の病害虫

ジャガイモ

疫病	< 少 >	発生は少なかった。
ニジュウヤホシテントウ類	< 少 >	発生は少なかった。

トマト（施設・半促成）

灰色かび病	< 少 >	発生は少なかった。
葉かび病	< 少 >	発生は少なかった。
白ぶくれ症	< 並 >	発生は平年並であった。
オンシツコナジラミ	< やや少 >	発生はやや少なかった。
タバココナジラミ	< やや少 >	発生はやや少なかった。
アブラムシ類	< 並 >	発生は平年並であった。

キュウリ

褐斑病	< 少 >	発生は少なかった。
うどんこ病	< やや少 >	発生はやや少なかった。
べと病	< やや少 >	発生はやや少なかった。
アブラムシ類	< 並 >	発生は平年並だった。

ナス

アザミウマ類	< 少 >	発生は少なかった。
ハダニ類	< やや多 >	発生はやや多かった。
アブラムシ類	< やや少 >	発生はやや少なかった。
ニジュウヤホシテントウ類	< 少 >	発生は少なかった。

コマツナ

白さび病	< 少 >	発生は少なかった。
炭疽病	< 少 >	発生は少なかった。
コナガ	< やや少 >	発生はやや少なかった。

ナモグリバエ	< 少 >	発生は少なかった。
カブラハバチ	< 少 >	発生は少なかった。
アザミウマ類	< やや多 >	発生はやや多かった。
ハウレンソウ		
べと病	< 少 >	発生は少なかった。
イチゴ（施設）		
灰色かび病	< やや少 >	発生はやや少なかった。
ハダニ類	< やや多 >	発生はやや多かった。
ネギ		
さび病	< やや少 >	発生はやや少なかった。
アブラムシ類	< 少 >	発生は少なかった。
アザミウマ類	< やや多 >	発生はやや多かった。
ネギハモグリバエ	< 並 >	発生は平年並であった。
キャベツ		
菌核病	< 少 >	発生は少なかった。
黒腐病	< 少 >	発生は少なかった。
コナガ	< やや少 >	発生はやや少なかった。
ヨトウガ	< やや少 >	発生はやや少なかった。
モンシロチョウ	< 少 >	発生は少なかった。
アブラムシ類	< やや少 >	発生はやや少なかった。
野菜共通の病害虫		
ネキリムシ類	< やや少 >	発生はやや少なかった。
アブラムシ類	< やや少 >	発生はやや少なかった。

（４）花きの病害虫

花き共通の病害虫

灰色かび病	< 少 >	発生は少なかった。
アブラムシ類	< やや少 >	発生はやや少なかった。

（５）島しょの病害虫

島しょ地域では多発生の病害虫は認められなかった。

4 侵入調査

チチュウカイミバエ	< 誘殺なし >
ウリミバエ	< 誘殺なし >
クインズランドミバエ	< 誘殺なし >
ミカンコミバエ種群	< 誘殺なし >
トマトキバガ	< 誘殺なし >

病害虫防除所ホームページ

<https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/shoku/anken/boujyo/>

病害虫の発生予察情報、発生状況、防除方法、
防除のポイントなどをお知らせしています。