

ムギ類*1 (作物群登録)

薬剤名	系統区分	作用機 構分類 コード	人畜 毒 性	使用 時期 (回数)	使 用 回 数	赤 か び 病	赤 さ び 病	う ど ん こ 病	さ び 病	斑 葉 病	裸 黒 穂 病	黒 条 病	な ま ぐ さ 黒 穂 病	眼 紋 病	雲 形 斑 病	黄 斑 病	網 斑 病	ア ブ ラ ム シ 類	ヒ メ ト ビ ウ ン カ	ム ギ ア カ タ マ バ エ	ム ギ キ モ グ リ バ エ	ア ワ ヨ ト ウ
イオウFL	無機	M2		-	-	◎	◎	◎														
カリグリーン溶	無機	NC		1	-	◎																
クムラス顆水	無機	M2		-	-	◎	◎	◎														
コロナFL	無機	M2		-	-	◎	◎	◎														
サルファーゾルFL	無機	M2	*c	-	-	◎	◎	◎														
撒粉ポルドー粉DL	無機	M1		-	-	◎																
石灰硫黄合剤	無機	M2		-	-	◎	◎	◎														
トリフミン水	DMI	3		14	3	◎	◎			◎	◎		◎				◎					
ワークアップFL	DMI	3		7	3	◎	◎	◎				◎				◎	◎					
ワークアップ粉DL	DMI	3		7	3	◎	◎	◎									◎					
ストロビーFL	QoI	11		14	3	ム	ム	ム														
バシタック水75	アミド	7		30	2				◎													
バシタック粉	アミド	7		30	2				◎													
トップジンM水	ベンゾ ^{イタ} ゾール	1		30	*b	ム	ム							ム								
トップジンM粉DL	ベンゾ ^{イタ} ゾール	1		14	*b	ム																
カナメFL	他	7	劇	7	2		◎	◎														
ベフラン液25	他	M7	劇	*a	1					ム	ム	ム					ム					
ベンレートT水20	有機硫黄・ベンゾ ^{イタ} ゾール	M3・1		*a	1					◎	◎	◎	◎	◎								
ホームイ水	有機硫黄・ベンゾ ^{イタ} ゾール	M3・1		*a	1					ム			ム									
スミトップM粉	有機リン・ベンゾ ^{イタ} ゾール	1B・1		14	1	ム	ム											ム	ム	ム		
モスピラン顆溶	ネオニコチノイド	4A	劇	7	2														◎			
アグロスリン乳	ピレスロイド	3A	劇	21	3														◎			
スミチオン乳	有機リン	1B		14	1													オ				オ

*1: ムギ類…「農薬登録における適用作物名について」(P. 40)を参照のこと。

- *a: 播種前
- *b: 3回以内(出穂期以降は1回以内)
- *c: 発病前～発病初期

オ: 大麦、小麦を除く
ム: 小麦を除く

ムギ類