

トウガラシ類*¹(作物群登録)(野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	系統区分	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	疫病	うどんこ病	斑点病	灰色かび病	黒枯病	炭疽病	苗木立枯病	斑点細菌病
トリフミン水	DMI	3		1	5		◎						
ラリー水	DMI	3		1	4		◎	◎					
ストロビーFL	QoI	11		1	2		シ						
カンタスDF	アミド	7		1	2				◎	◎			
ロブラール水	ジカボキシミド	2		3	2				シ				
サンヨール乳	有機銅	M1		1	4		甘						
オーソサイド水80	他	M4		*b	2							◎	
オリゼメート粒	他	P2		*a	1		◎	◎					
ライメイFL	他	21		1	3		◎						
ランマンFL	他	21		1	4		◎						
シグナムWDG	QoI・アミド	11・7		1	2		◎		◎	◎	◎		
ユニフォーム粒	QoI・アミド	11・4		1	1		シ						
カスミンボルドー水	抗生物質・無機	24・M1		1	5		◎	◎					◎

*1: トウガラシ類…「農薬使用に関するよくあるお問い合わせ」(P.69)を参照のこと。

*a: 定植時 *b: 播種後～2～3葉期まで
シ: シシトウを除く 甘: 甘長トウガラシのみに適用

トウガラシ類*1 (作物群登録)(野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	系統区分	作用機 構分類 コード	人 畜 毒 性	使 用 時 期 (日 数)	使 用 回 数	ア ブ ラ ム シ 類	コ ナ ジ ラ ミ 類	ア ザ ミ ウ マ 類	ミ ナ ミ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ 類	ミ カ ン キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ 類	タ バ コ ガ 類	オ オ タ バ コ ガ 類	ハ ス モ ン ヨ ト ウ 類	ネ キ リ ム シ 類	コ ガ ネ ム シ 類 幼 虫	ケ ラ	チ ヤ ノ ホ コ リ ダ ニ	ハ ダ ニ 類	
スピノエース顆水	スピノシ	5		1	2			甘	甘	甘									
コロマイト乳	マコロイト	6		1	1		甘												
カスケード乳	I GR	15		1	3				甘										
マッチ乳	I GR	15		1	4							◎							
アドバンテージ粒	カーバート	1A	劇	*c *a	1				◎	◎									
オンコル粒5	カーバート	1A		*d	1				◎										
ダニトロンFL	殺ダニ	21A			1	1													◎
モベントFL	殺ダニ	23		*i	1	灌	灌	灌	灌	灌								灌	灌
				1	3	◎	◎	◎	◎	◎								◎	◎
フェニックス顆水	ジアイト	28		1	2							◎							
ブレバソンFL5	ジアイト	28		*i	1	灌							灌						
				1	3							◎	◎						
ディアナSC	スピノシ	5		1	2			◎											
アクタラ顆溶	ネコチノイト	4A		1	3	シ													
アクタラ粒5	ネコチノイト	4A		*a	1	◎													
アドマイヤー顆水	ネコチノイト	4A	劇	*j	2	◎		◎	◎	◎									
アドマイヤー1粒	ネコチノイト	4A		*a *c	1	◎		◎	◎	◎									
アルバリン顆溶	ネコチノイト	4A		1	2	◎	◎	◎	◎	◎									
スタークル顆溶	ネコチノイト	4A																	
アルバリン粒	ネコチノイト	4A		*e *a *g *h	1	◎ ◎	◎	◎	◎	◎									
スタークル粒	ネコチノイト	4A				◎	葉	葉	葉	葉									
ダントツ溶	ネコチノイト	4A		1	3	◎	◎		◎										
バリアード顆水	ネコチノイト	4A	劇	1	3	◎													
ベストガード溶	ネコチノイト	4A		1	3		◎												
ベストガード粒	ネコチノイト	4A		*a	1	シ			シ										
モスピラン顆溶	ネコチノイト	4A	劇	1	2	シ													
アディオソ乳	ピレスロイト	3A		7	2	◎					タ								
アーデント水	ピレスロイト	3A		1	2	◎			◎										◎
アニキ乳	マコロイト	6		1	3		◎					◎	◎					◎	
アフアム乳	マコロイト	6		7	2							◎							
サンヨール乳	有機銅			1	4	甘													
ダイアジノン粒5	有機リン	1B		*f *b	3 2										◎			◎	

トウガラシ類

トウガラシ類*1 (作物群登録) (野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	系統区分	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(回数)	アブラムシ類	コナジラミ類	アザミウマ類	ミナミキイロアザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ類	タバコガ	オオタバコガ	ハスモンヨトウ類	ネキリムシ類	コガネムシ類	ケ	チャノホコリダニ	ハダニ	
コテツFL	他	13	劇	1 2														シ
コルト顆水	他	9B		1	2	ア甘	ア甘											
チェス顆水	他	9B		1	3	◎												
ブレオFL	他	UN		1	2			◎	○	○	◎	○						
アプロードエースFL	殺ダニ・IGR	21A・16		1	2	◎												

*1: トウガラシ類…「農薬使用に関するよくあるお問い合わせ」(P. 69)を参照のこと。

*a: 定植時

*b: 播種時又は定植時

*c: 育苗期後半

*d: 育苗期後半または定植時

*e: 育苗期

*f: 収穫開始14日前まで

*g: 定植時(但し収穫30日前まで)

*h: 生育期(但し収穫開始14日前まで)

*i: 育苗期後半～定植当日

*j: 収穫前日まで(但し露地栽培については開花期終了後から)

ア: 甘長トウガラシを除く

シ: シシトウを除く

甘: 甘長トウガラシのみに適用

葉: トウガラシ(葉)のみに適用

タ: タバコガ

灌: 灌注処理での登録

※トウガラシ(葉)は農薬取締法上は野菜類に分類される。葉を食用として収穫する場合、野菜類又はトウガラシ(葉)に登録がある農薬しか使用できない。

トウガラシ(葉)の登録における「使用時期(回数)」は、葉を収穫する前までの回数なので注意する。