

ダイコンの「つまみ菜、間引き菜」への農薬使用について




注意！：本書の「つまみ菜、間引き菜」とは、**ダイコンの若苗**のことである。雪白体菜やコマツナ、ハクサイ、ハツカダイコン等、ダイコン以外の作物は含まれない。

1. 農薬使用の基本的な考え方

ダイコンの栽培初期(播種前・定植時等)に使用する殺菌剤・殺虫剤は、登録を得る段階でつまみ菜と間引き菜においても残留農薬調査を実施している。問題のあった農薬、または安全性が確認されていない農薬のラベルには「つまみ菜、間引き菜には使用しない」等の記述がある(購入時期が古い剤には記述がない場合もあるので注意)。

なお、生育期間中(収穫〇日前等)に使う農薬については、特につまみ菜、間引き菜を対象とした安全性の検討は行われていない。

◆ダイコンのつまみ菜、間引き菜を収穫・出荷する場合は、以下の注意に従って農薬(殺菌剤・殺虫剤)を使用すること。

| 収穫・出荷時の状態 | 栽培初期に使用する農薬 (粉剤・粒剤 等) | 生育期間中に使う農薬 (水和剤・乳剤 等) |
|--|--|---|
|  <p>つまみ菜より 若いダイコン</p> | <p>●農薬は使用しない ＝ 農薬を使った場合には収穫・出荷しない。</p> | |
|  <p>つまみ菜 …本葉概ね2枚以上</p> | <p>◎ラベルを確認して使用 ラベルに 「農薬を使用した場合には、収穫・出荷しない」</p> | <p>●使用した場合には、収穫・出荷を控える。</p> |
|  <p>間引き菜 …本葉概ね4枚以上</p> | <p>「つまみ菜、間引き菜には使用しない」 「本剤を使用したダイコンは、つまみ菜、間引き菜として食用に供さない」 …等の記述がある農薬は、使用しない</p> | <p>◎使用はできるだけ控える。使用する場合には、<u>間引き菜を収穫する日を「収穫日」として、使用時期を守って散布する。</u> ※ラベルに「収穫7日前まで」とある農薬の場合は、間引き菜を収穫する日から数えて7日前までに使用する</p> |

つまみ菜・間引き菜

※ このページは、殺菌剤・殺虫剤についてのみ示している。除草剤については、「除草剤使用指針」を参照のこと

※ 詳細は、農業改良普及センター、病害虫防除所等関係機関に問い合わせること

2. つまみ菜・間引き菜を収穫する場合に使用してはいけない農薬

主な殺菌剤・殺虫剤及び土壌処理剤のうち、以下の剤についてはつまみ菜や間引き菜を収穫・出荷する圃場で使用してはいけない。また、この他の農薬を使用する場合にも、ラベルの記述を確認すること。

●「野菜類」で登録のある殺菌剤

| | |
|-----------|---------|
| 商品名 | (有効成分) |
| オーソサイド水80 | (キャブタン) |

▲「ダイコン」で登録のある殺菌剤

| | | | |
|---------|-------------|----------|------------|
| 商品名 | (有効成分) | 商品名 | (有効成分) |
| リゾレックス粉 | (トルクロホスメチル) | ネビジン粉 | (フルスルファミド) |
| ビシロックFL | (ピカルプトラゾクス) | バシタック水75 | (メブロンル) |
| メジャーFL | (ピコキシストロピン) | | |

◆「ダイコン」で登録のある殺虫剤

| | | | |
|----------|--------------------------|------------|-------------|
| 商品名 | (有効成分) | 商品名 | (有効成分) |
| アクタラ顆溶 | (チアメトキサム) | ダーズパン粒 | (クロルピリホス) |
| アクタラ粒5 | (チアメトキサム) | ディアナSC | (スピネトラム) |
| アドマイヤー1粒 | (イミダクロプリド) | トランスフォームFL | (スルホキサフロル) |
| アペイル粒 | (アセタミプリド・シア ントラニプロール) | トルネードエースDF | (インドキサカルブ) |
| アルバリン粒 | (ジノフテラン) | ネキリエースK粒 | (イソキサチオン) |
| アルバリン顆溶 | (ジノフテラン) | ネマトリンエース粒 | (ホスチアゼート) |
| ウララDF | (フロニカミド) | バイデートL粒 | (オキサミル) |
| オルトラン粒 | (アセフェート) | パダン粒4 | (カルタップ) |
| カルホス微粒F | (イソキサチオン) | ビーラム粒 | (フルオピラム) |
| カルホス粉 | (イソキサチオン) | フォース粒 | (テルフトリン) |
| ジェイエース粒 | (アセフェート) | ブリロツ粒 | (シアントリアロール) |
| スタークル顆溶 | (ジノフテラン) | プレバソソFL5 | (クワントリアロール) |
| スタークル粒 | (ジノフテラン) | ベネピアOD | (シアントリアロール) |
| | | ラグビーMC粒 | (カズサホス) |

3. ダイコンの幼苗期に使用すると薬害の恐れがある農薬

本指針掲載農薬のうち、ダイコンの生育初期に使用した場合の薬害事例をメーカーが公表している剤を下表に示す。この他の剤についても、施用時の気象条件や作物の状態により薬害を生じることがあるので十分に注意する。

○「野菜類」で登録のある殺菌剤

| | |
|-----------|-----------------|
| 商品名 | (有効成分) |
| コサイドボルドー水 | (無機銅) |
| ジーファイン水 | (炭酸水素ナトリウム・無機銅) |

△「ダイコン」で登録のある殺菌剤

| | | | |
|----------|----------------------|-----------|-------------|
| 商品名 | (有効成分) | 商品名 | (有効成分) |
| 乙ボルドー水 | (無機銅) | クプロシールドFL | (無機銅) |
| キンセット水 | (無機銅・有機銅) | カスミンボルドー水 | (カサマイシ・無機銅) |
| キンセット水80 | (無機銅・有機銅) | ハチハチ乳 | (トルフェンピラド) |
| ユニフォーム粒 | (アジキストピリン・メタキシ M) | | |

◇「ダイコン」で登録のある殺虫剤

| | | | |
|--------|-------------|--------|------------|
| 商品名 | (有効成分) | 商品名 | (有効成分) |
| アタブロン乳 | (クロルフルアズロン) | パダンSG溶 | (カルタップ) |
| コテツFL | (クロルフェナビル) | ハチハチ乳 | (トルフェンピラド) |