

タカナ(野菜類、非結球アブラナ科葉菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	系統区分	作用機 構分 類 コ ー ド	人 畜 毒 性	使 用 時 期 (日 数)	使 用 回 数	白 斑 病	コ ナ ガ	ネ キ リ ム シ 類
ストロビーFL	Q o I	11		7	2	◎		
ノーモルト乳	I G R	15		14	2		◎	
ガードベイトA粒	ピレスロイド	3A		*a	2			◎
ネキリベイト粒	ピレスロイド	3A		*a	2			◎

*a:生育初期(但し収穫14日前まで)

病害虫名	防除時期	防除方法	参考事項
白斑病	生育期	1. 雨よけ栽培を行う。また、マルチを施用し泥はねを防止する。 2. 発生が認められたら次の薬剤を散布する。 ストロビーフロアブル 3000倍	秋季～初冬に雨が多 いと多発しやすい。 ◇成虫の交尾阻害が目 的。使用にあたって は、「昆虫フェロモン を用いた防除資材」の 項参照。 施設栽培ではハウス 内の天井に近い位置に 100～400m/10 a (100 mリール)となるよう 固定する。 *1野菜類での登録 *2非結球アブラナ科葉 菜類での登録
	収穫後	・収穫後の残渣は丁寧にとり除 き、畑にすきこまない。	
コナガ	播種時 生育期	1. バスライトやバオバオ等による 被覆栽培により成虫の侵入を防 ぐ。施設栽培ではサイドネットや 入り口に防虫網を設置する。 2. 露地栽培ではコナガコン◇を8～ 10m間隔に支柱を立て、たるまな いように畝に平行に100～110 m /10 a 又は20cmチューブを200本 /10 a 設置する。 3. 発生を見たら次の薬剤のいづれ かを散布する。 エスマルクDF*1 1000～2000倍 サブリナフロアブル*1 1000～1500倍 ノーモルト乳剤 2000倍 プレバゾンフロアブル*2 2000倍	