

# モロヘイヤ(野菜類の登録農薬も使用できる)

薬剤名	系統区分	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(日数)	使用回数	灰色かび病	黒星病	アブラムシ類	コナジラミ類	カメムシ類	アザミウマ類	ハスモンヨトウ	マメコガネ	ハダニ類
アミスター20FL	Q o I	11		1	4	◎	◎							
スピノエース顆水	ｽﾍﾞﾝｼﾝ	5		3	3						◎			
コロマイト乳	ｸﾞﾙﾏｲﾄ	6		1	1									◎
カスケード乳	I GR	15		7	2							◎		
ダニトロンFL	殺ダニ	21A		7	1									◎
プレバソンFL 5	ｼﾞｱﾝﾄ	28		1	2							◎		
アクタラ顆溶	ｱｸﾀﾗｲﾄ	4A		7	3						ギ			
アドマイヤーFL	ｱﾄﾞﾏｲﾔｰ	4A	劇	14	1						◎			
ベストガード溶	ﾍﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞ	4A		7	3				◎					
モスピラン顆溶	ﾓｽﾋﾟﾗﾝ	4A	劇	21	1				◎					
トレボン乳	ﾄﾚﾋﾞﾝ	3A		14	1						◎			
アフーム乳	ｱﾌｰﾑ	6		1	3							◎		
スミチオン乳	有機リン	1B		14	2			◎		◎	◎		◎	
コテツFL	他	13	劇	7	1						◎			

ギ:ネギアザミウマ

病害虫名	防除時期	防除方法	参考事項
アザミウマ類	生育期	<ul style="list-style-type: none"> <li>発生を見たら次の薬剤のいずれかを散布する。</li> <li>アクタラ顆粒水溶剤# 2000倍</li> <li>アドマイヤーフロアブル 2000倍</li> <li>コテツフロアブル 2000倍</li> <li>スピノエース顆粒水和剤 5000倍</li> <li>トレボン乳剤 1000倍</li> </ul>	#ネギアザミウマのみの登録
マメコガネ	生育期	<ul style="list-style-type: none"> <li>発生を見たら次の薬剤を散布する。</li> <li>スミチオン乳剤 1000倍</li> </ul>	
ハダニ類	生育期	<ul style="list-style-type: none"> <li>発生を見たら次の薬剤のいずれかを散布する。</li> <li>コロマイト乳剤 1500倍</li> <li>ダニトロンフロアブル 2000倍</li> </ul>	
その他の病害虫		苗立枯病、変形菌病	

モロヘイヤ