

果樹類(作物群登録)

薬剤名	系統区分	作用機構分類コード	人畜毒	使用時期(回数)	うゆ	アブ	スシ	コカ	ハキ	リン	ミダ	ナシ	モモ	シヤク	ケム	ハダ	サビ	カタ	ナメ
			性	(日数)	病	進	類	類	類	類	類	類	類	類	類	類	類	類	類
トップジンMペースト	ベンゾイミダゾール	1	*b	3	マ														
エコビタ液	天然物由来	-		1	カ	カ													
エスマルクDF	BT	11A	*d	-				リ	リ					リ	リ				
デルフィン顆水	BT	11A	*d	-				◎	◎	◎				◎					
ゼンターリ顆水	BT	11A	*d	-				◎	◎	◎									
チューンアップ顆水	BT	11A	*d	-				◎	◎	◎									
ファイブスター顆水	BT	11A	*d	-				◎	◎	◎				◎					
バイオリサ・カミキリ	微生物	-	*k	-													◎		
スパイカルプラス	天敵生物	-	*g	-														◎	
スパイカルEX	天敵生物	-	*g	-														◎	
スパイデックス	天敵生物	-	*g	-														◎	
スワルスキープラス	天敵生物	-	*L	-														◎	
バイオセーフ	天敵生物	-	*c *e	-					◎					◎					
コンフューザーAA	フェロモン	-	*h	-		◎				◎	◎	◎	◎						
コンフューザーMM	フェロモン	-	*h	-				コ	◎	◎	◎	◎	◎						
コンフューザーN	フェロモン	-	*h	-				チ	◎	◎	◎	◎	◎						
コンフューザーR	フェロモン	-	*h	-					◎	◎	◎	◎	◎						
シンクイコンール	フェロモン	-	*h	-										◎					
スカシバコンL	フェロモン	-	*h	-				◎											
ナシヒメコン	フェロモン	-	*h	-									◎						
ハマキコンールN	フェロモン	-	*h	-				チ	◎	◎	◎								
石灰硫黄合剤	無機	UN	夏 冬	-														◎ ◎	
クムラス顆水	無機	UN	-	-														◎	
スラグ*	天然物由来	UN	*n	-															◎◎
粘着くん水	天然物由来	-	1	-		カ													カ
ベニコカミキリムシエアゾール ロビンフッド	ヒレスロイト	3A	1	5			か	か											
アカリタッチ乳	天然物由来	-	1	-															オ
オレート液	天然物由来	-	*f	-		ナ													

\*1:「ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイ、ヒメリンゴマイマイが加害する農作物等」での登録。

\*b: 剪定整枝時、病患部削り取り直後、及び病枝切除後

\*c: 夏蝻が形成される時期～羽化脱出前まで \*d: 発生初期(但し収穫前日まで) \*e: 幼虫発生期

\*f: 発生初期～収穫前日まで \*g: 発生初期 \*h: 成虫発生初期～終期

\*k: 成虫発生初期 \*L: 発生直前～発生初期 \*n: 発生時

オ: オウトウを除く カ: カンキツを除く コ: チャノココクモンハマキ

チ: チャハマキ及びチャノココクモンハマキ ナ: ナシを除く

マ: モモ、リンゴ、ナシ、カキ、マルメロ、カリン、イチジク、カンキツ、オウトウ、小粒核果類、ピロ、キウイフルーツ、ブドウ、クワ、オリーブを除く

ミ: 施設栽培でミカンハダニに登録

リ: リンゴを除く

か: カンキツ、リンゴ、ナシ、ピロ、モモ、スモモ、ウメ、オウトウ、ブドウ、カキ、マンゴーを除く

施: 施設栽培

夏: 夏期 冬: 冬期

果  
樹  
類